



## Num. 101. Publicado el 13/11/2006

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Orchis purpurea*. Por José Luis Porto Torres



**Num. 101. Publicado el 13/11/2006**

## Descripciones de especies

### *Vaccinium myrtillus* L.

Planta arbustiva densamente ramificada que alcanza los 60 cm. Los tallos, que surgen de rizomas subterráneos, son procumbentes, radicantes, de color v...

Crece en bosques frescos como robledales y hayedos, matorrales y brezales que se desarrollan preferentemente sobre suelos ácidos, entre los 500 y 2200...

Europa, Asia y N de América. N de la Península Ibérica, Sistemas Central e Ibérico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vaccinium-myrtillus.html>

### *Rhodymenia holmesii* Ardissone

Alga roja que tiene un estolón aparente, ramificado, del que van surgiendo frondes erectas laminares, con aspecto general de abanico, que se originan ...

Crece en rocas, hasta 25 m de profundidad, donde los estolones forman una red en zonas blandas y entre esponjas; tolera una cierta cobertura por arena...

De las Islas Británicas a Portugal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rhodymenia-holmesii.html>

### *Pluteus leoninus* (Schaeff.) P. Kumm.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), de un llamativo color amarillo. El sombrero, de 3 a 7 cm de diámetro, de cónico a embon...

Vive sobre ramas caídas de árboles planifolios o coníferas, madera en putrefacción e incluso serrín....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pluteus-leoninus.html>

### *Phormidium autumnale* (C. Agardh) Trevisan ex Gomont

Alga que forma colonias extensas de color de azul verdoso oscuro a verde oliva que algunas veces toma tonos amarillentos o violáceos. Los filamentos e...



Crece sobre suelo húmedo, fango, base de paredes en calles estrechas y húmedas, rocas del cauce de ríos, en zonas que presentan una humedad de forma i...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phormidium-autumnale.html>

## *Ophrys apifera* Huds.

Quizás una de las orquídeas silvestres más conocidas. Es una planta perenne, autótrofa, con 2, a veces 3 tubérculos sésiles, esféricos y enterrados, d...

Vive en pastizales, taludes, matorrales, rellanos pedregosos, claros de matorrales, ribazos, en zonas principalmente calizas, secas y soleadas, desde ...

Presente en toda la Región Mediterránea y bastante extendida por toda la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ophrys-apifera.html>

## *Lipohrys pholis* Linnaeus, 1758

Es un blenio que alcanza hasta unos 16 cm de longitud, y un peso de unos 111 gramos. Posee unos pequeños tentáculos sobre las aperturas nasales, pero ...

Es demersal y no realiza migraciones. Vive en zonas rocosas de aguas poco profundas (hasta 8 m de profundidad), estableciendo una serie de refugios "f...

Desde las costas del sur de Noruega hasta Marruecos, Islas Madeira e Islas Canarias. También presente en el Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ricardo Roberto

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lipohrys-pholis.html>

## *Lenzites betulina* (L.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos con un sombrero de unos 5 cm de diámetro o algo más, plano, delgado, con la superficie a veces imbricada, pel...

Crece sobre madera muerta en descomposición, a veces sobre árboles vivos e incluso madera trabajada....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lenzites-betulina.html>

## *Gracilaria multipartita* (Clemente) Harvey

Alga roja que está fijada al sustrato por un pequeño disco del que surge una o varias frondes erectas ramificadas de hasta 25 cm, de textura



cartilagi...

Es un alga que crece en rocas, del sublitoral a hasta 15 m de profundidad....

En Europa aparece desde las Islas Británicas a la costa senegalesa, incluyendo el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gracilaria-multipartita.html>

## *Champia parvula* (C. Agardh) Harvey

Alga roja anual fácil de reconocer, cuyas frondes surgen en pequeñas matas de un pequeño disco basal, mucilaginosas pero de consistencia firme, y que ...

Crece sobre rocas, a veces sobre otras algas, en charcas del sublitoral superior....

Aparece desde las Islas Británicas a Marruecos y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/champia-parvula.html>

## *Armillaria ostoyae* (Romagn.) Herink

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de 2 - 3 cm de diámetro, convexo, hemisférico, con el margen incurvado ...

Vive sobre madera en descomposición....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/armillaria-ostoyae.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Amanita vaginata* (Bull.) Lam. (Basidiomycota)

*Coprinellus disseminatus* (Pers.) J.E. Lange (Basidiomycota)

*Dryopteris corleyi* Fraser-Jenkins (Pteridophyta)

*Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray (Pteridophyta)

*Ganoderma lipsiense* (Basidiomycota)



*Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray (Basidiomycota)

*Leccinum quercinum* Pilát & Dermek (Basidiomycota)

*Otidea onotica* (Pers.) Fuckel (Ascomycota)

*Quercus rotundifolia* Lam. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008