



Num. 103. Publicado el 27/11/2006

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Erythronium dens-canis*. Por César Fernández González



Num. 103. Publicado el 27/11/2006

Descripciones de especies

Xanthium strumarium subsp. italicum (Moretti) D. Löve

Planta anual aromática con tallos de 20 - 120 cm, a menudo con líneas o puntos violáceos o rojizos, ramificados y no espinosos. Las hojas, pelosas en ...

Crece en cunetas, terrenos ruderalizados, orillas de ríos, lagos, pastos. Es una planta característica de comunidades pertenecientes a la Clase Bident...

Presente en el E, C y S de Europa. Es posiblemente una especie introducida de América. Invade tanto cultivos agrícolas de regadío o secano fresco como...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/xanthium-strumarium-subsp-italicum.html>

Vincetoxicum hirundinaria Medik. s.l.

Planta rizomatosa perenne. Los tallos, de hasta 60 cm de altura, glabros o con alguna banda longitudinal de pelos cortos y aplicados. Las hojas, opuest...

Crece en pedregales calizos, orlas de encinares, pastos y matorrales con pH básico, en zonas secas y luminosas....

Presente en la mayor parte de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vincetoxicum-hirundinaria.html>

Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud.

Macroscopía. Hongo que forma fructificaciones solitarias o gregarias, de espatuladas a clavadas, de 30 - 80 mm en las que se diferencia un pedúnculo r...

Crece en prados y zonas húmedas como turberas, en ocasiones acompañado de plantas como *Drosera rotundifolia*....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trichoglossum-hirsutum.html>

Lyngbya semiplena (C. Agardh) J. Agardh ex Gomont

Alga cianofícea que forma masas viscosas de color amarillo verdoso y consistencia viscosa cuando está húmeda. El talo está formado por filamentos que ...



Vive en rocas o charcas del supralitoral principalmente, pero en ocasiones puede aparecer sobre rocas del intermareal e incluso creciendo sobre algas ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lyngbya-semiplena.html>

Laccaria fraterna (Cooke & Massee) Pegler

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de 1.5 - 4 cm de diámetro, convexo, con el margen incurvado al principi...

Crece, de forma gregaria, bajo árboles introducidos como el eucalipto (*Eucalyptus globulus*) y la mimosa (*Acacia dealbata*), con quienes fue introducid...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/laccaria-fraterna.html>

Hygrocybe virginea (Wulfen) P.D. Orton & Watling

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 10 a 70 mm de diámetro, al principio hemisféricos, plano convexos o algo cónicos, más tarde aplanados, en o...

Crece en prados musgosos o bordes de camino en otoño y principios de invierno....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-virginea.html>

Crepis pygmaea L.

Planta herbácea perenne provista de un rizoma subterráneo del que surge una roseta de hojas basales. Estas hojas son lanceoladas, pecioladas, de 3 - 1...

Crece en gleras y pedregales calizos de la alta montaña en zonas soleadas y secas, entre los 1600 y 2400 m de altitud. Es una planta característica de...

Montañas del SO de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/crepis-pygmaea.html>

Cichorium intybus L.

Planta perenne glabra o con pelos subbrígidos y provista de una fuerte y larga raíz napiforme. Los tallos son normalmente solitarios y ramificados, de ...



Crece en prados y cultivos.em>....

Presente en la mayor parte de Europa, es originaria del Viejo Mundo y se cultiva para ser empleada como adulterante o sucedáneo del café acabó con su ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cichorium-intybus.html>

Carex flacca Schreb.

Planta no cespitosa provista de rizomas subterráneos reptantes que no son muy gruesos. De estos rizomas surgen tallos trígonos que tienen vainas en la...

Crece en suelos húmedos, en zonas abiertas preferentemente, entre el nivel del mar y los 2300 m. Forma parte, entre otras, de las siguientes comunidad...

Aparece en Europa, el N de África y algunas zonas del O de Asia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-flacca.html>

Antirrhinum braun-blanquetii Rothm.

Hierba perenne, glabra en la zona media e inferior, glandular-pubescente en la inflorescencia, con indumento homótrico formado por pelos glandulífero...

Vive en escombreras, roquedos, muros, taludes, matorrales soleados de suelos calizos y a veces sobre pizarras, en zonas de suelo húmedo. Desde el nive...

Presente en el NO de la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/antirrhinum-braun-blanquetii.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Laccaria amethystina (Huds.) Cooke (Basidiomycota)

Trentepohlia abietina (Flotow) Hansgirg (Chlorophyta)



Artículos

El Jurásico asturiano

Por Lorenzo Corchón, A. & Menéndez Valderrey, J.L.

