



Num. 104. Publicado el 04/12/2006

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Macrolepiota konradii*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 104. Publicado el 04/12/2006

Descripciones de especies

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze

Planta perenne estolonífera con tallos procumbentes de 5 - 30 cm. Las hojas son anchamente lineares, aplicadas de jóvenes, obtusas. Las flores se reúnen...

Crece en zonas costeras arenosas, terrenos ruderales, desde el nivel del mar a los 300 m de altitud. Es una planta que forma parte de comunidades pert...

Naturalizada en el SO de Europa y Sicilia. Introducida, de origen tropical, que cuando encuentra condiciones favorables, se comporta muy agresiva y vi...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stenotaphrum-secundatum.html>

Simethis mattiazzii

Planta perenne, glabra, más o menos escapasa que tiene una base no bulbosa, corta y con raíces carnosas. El tallo, de 12 - 40 cm, es erecto, delgado y...

Crece en brezales y claros forestales, desde el nivel del mar a los 1100 m. ...

Mediterráneo occidental -desde el NO de Marruecos al C de Italia- y zonas atlánticas europeas, de modo que llega por el N hasta Gran Bretaña e Irlanda...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/simethis-mattiazzii.html>

Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak

Planta herbácea, perenne, cespitosa, con rizoma de entrenudos cortos. Tallos de 10-120 x 0,1-0,5 cm, más o menos cilíndricos. Hojas reducidas a vainas ...

Prados y terrenos al menos con algo de humedad, en todo tipo de sustratos, aunque preferentemente arenosos; 0-1800 m....

Europa central (hasta S de Inglaterra y N de Alemania), región mediterránea, Asia occidental y Sudáfrica. Abundante por toda la Península y Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scirpoides-holoschoenus.html>



Paspalum vaginatum Sw.

Planta perenne estolonífera, con tallos de 6 - 50 cm provistos de una vaina glabra en el ápice y la lígula ciliada en la cara abaxial. Las flores apar...

Crece en humedales salobres. Es una planta característica de comunidades pertenecientes a la alianza Paspalo - Agrostion verticillati (orden Plantagin...

Costa sur de Europa. Es una especie introducida, de origen tropical, que invade humedales en numerosas regiones cálidas. Excluye a las especies halófi...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/paspalum-vaginatum.html>

Lathraea clandestina L.

Planta herbácea perenne con tallos subterráneos o casi de los que salen las flores en fascículos y un rizoma ramificado con varios catáfilos subterrá...

Crece en bosques riparios y hayedos pirenaicos, parasitando raíces de Salix, Populus, Alnus y Fagus....

Aparece en el SO de Europa. En la Península en su mitad N, excepto en el extremo oriental....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lathraea-clandestina.html>

Juncus articulatus L.

Planta perenne, de entre 5 y 70 cm de altura, cespitosa o rizomatosa. Tiene tallos erectos o ascendentes, que a veces enraízan en los nudos; son cilín...

Crece en zonas con alta humedad edáfica, como turberas planas oligotróficas y pastizales efímeros de bordes de lagunas inundadas gran parte del año. A...

Aparece en Europa, Asia y zona templada norteamericana. Está introducido en el sur de África, Australia y Nueva Zelanda....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/juncus-articulatus.html>

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

Mide entre 25 y 30 cm, als de 13-14 cm. Ave de color pardo oscuro en su parte dorsal, con rayas cremas, blancas y negras. Vientre blanco. Su rasgo mas...

Es frecuente en prados húmedos, en cenagales, riberas, y en marismas donde abunde la vegetación. Si bien se trata normalmente de un ave migratoria, es...

Toda la franja de clima templado de Eurasia y América....



Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gallinago-gallinago.html>

Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)

Ave pequeña, de unos 19 centímetros de longitud, de color pardo en su parte dorsal y blanco en la ventral, muestra un collar alrededor del pecho de co...

Normalmente se ve en la costa, aunque también puede estar en aguas interiores sobre todo en el norte, normalmente en lagos salados. Es un ave migrador...

Presente en toda la costa atlántica europea hasta el norte de África y gran parte de la mediterránea también. Cría prácticamente en toda Europa, excep...

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/charadrius-hiaticula.html>

Bromus hordaceus L.

Planta anual de tallos normalmente erectos, entre 3 y 80 cm de altura. Las hojas tienen una vaina fuertemente peluda. Las flores se reúnen en panícula...

Crece en prados de siega, ribazos, zonas removidas, desde el nivel del mar a los 1200 m. Es una planta que aparece en las siguientes comunidades:Las p...

Ampliamente distribuida por Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bromus-hordaceus.html>

Arbutus unedo L.

Planta arbustiva de 1.5 - 3 m, que ocasionalmente puede tener porte arbóreo de hasta 12 m. El tronco tiene la corteza pardo - rojiza, delgada y agriet...

Crece en orlas de bosques como encinares y laderas pedregosas desde el nivel del mar a los 800 m. Es indiferente a la naturaleza química del suelo y c...

Región mediterránea y SO de Europa, hasta alcanzar el NO de Irlanda....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arbutus-unedo.html>



Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Gymnopilus spectabilis (Basidiomycota)

Artículos

Arnao, la Capilla Sixtina del Devónico

Por Fernández Martínez, R.R.

