



## Num. 107. Publicado el 25/12/2006

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Alnicola macrospora*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 107. Publicado el 25/12/2006**

## Descripciones de especies

### *Helvella leucomelaena* (Pers.) Nannf.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos con forma de copa u olla, de 2 - 5 cm de diámetro, cerrados y globosos al principio pero que luego se abren d...

Crece durante primavera en zonas de suelo pobre y arenoso en las cercanías de pinares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/helvella-leucomelaena.html>

### *Galerina laevis* (Pers.) Singer

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un pequeño sombrero de hasta 1 cm de diámetro, campanulado al principio, luego exte...

Vive en zonas musgosas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galerina-laevis.html>

### *Flammulina velutipes* (Curtis) Singer

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero primero convexo y luego abierto, casi plano, de 5 - 10 cm, plano, de co...

Crece desde mediados de otoño a principios de primavera sobre troncos y ramas muertas de árboles planifolios en densos grupos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/flammulina-velutipes.html>

### *Exidia truncata* Fr.

Macroscopía: hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas) gelatinosos, al principio con forma de botón que luego se hacen algo globosos, de 1...

Crece sobre ramas muertas de frondosas, especialmente de robles (*Quercus robur*)....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/exidia-truncata.html>

ISSN 1887-5068



## *Elaphomyces muricatus* Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (ascomas) hipógeos, enterrados, de 2 a 5 cm de diámetro, de color amarillo ocre o pardo, con la superficie fo...

Vive en bosques de coníferas y bosques de planifolios como robles (*Quercus robur*), hayas (*Fagus sylvatica*) y castaños (*Castanea sativa*)...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/elaphomyces-muricatus.html>

## *Cyathus striatus* (Huds.) Willd.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos de forma bastante llamativa, como el resto de especies de la familia, ya que semejan nidos de pájaros. Tienen...

Crece sobre ramas caídas de primavera a otoño formando grupos a veces densos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cyathus-striatus.html>

## *Crepidotus versutus* (Peck) Sacc.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos de 1 - 2.5 cm de diámetro, con la superficie cubierta de un fieltro blanco. Está fijado al sustrato por un pi...

Lignícola, ya que crece sobre restos vegetales enterrados y ramas en descomposición....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/crepidotus-versutus.html>

## *Crepidotus variabilis* (Pers.) P. Kumm.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 0.5 - 2 cm de diámetro, con aspecto de concha o reniforme y el marge...

Crece sobre ramas de frondosas muertas en zonas húmedas, sombrías, en verano y otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/crepidotus-variabilis.html>

## *Crepidotus luteolus* (Lamotte) Sacc.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 1 - 3 cm de diámetro, de color amarillento, más pálido cuanto más jo...

Vive sobre plantas herbáceas, rara vez leñosas....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/crepidotus-luteolus.html>

*Coprinellus micaceus* (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 3 - 5 cm de diámetro, ovoide primero y cónico campanulado después, c...

Crece formando céspedes más o menos densos sobre madera en descomposición....

*Coprinus truncorum*, pero tiene el pie liso a la lupa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coprinellus-micaceus.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Agaricus xanthodermus* Genev. (Basidiomycota)

*Carex flacca* Schreb. (Magnoliophyta)

*Clitocybe nebularis* (Batsch) P. Kumm. (Basidiomycota)

*Cyathus olla* (Batsch) Pers. (Basidiomycota)

*Inocybe geophylla* (Sowerby) P. Kumm. (Basidiomycota)

*Mycena seynesii* Quéf. (Basidiomycota)

*Rubia peregrina* L. (Magnoliophyta)

*Trichoglossum hirsutum* (Pers.) Boud. (Ascomycota)

*Vascellum pratense* (Pers.) Kreisel (Basidiomycota)

*Volvariella gloiocephala* (DC.) Boekhout & Enderle (Basidiomycota)

*Xylaria hypoxylon* (L.) Grev. (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



## Artículos

### **Flora y fauna de Vega de Arenas (Asturias)**

Por Martínez Junceda, J.

