



## Num. 108. Publicado el 01/01/2007

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Ligusticum lucidum*. Por César Fernández González



**Num. 108. Publicado el 01/01/2007**

## **Descripciones de especies**

### *Lanzia echinophila* (Bull.) Korf

Es un hongo que produce típicas fructificaciones (setas) en forma de copitas marrones de hasta 1 cm de diámetro, soportadas por un pie negruzco de tam...

Su hábitat es muy específico ya que se desarrolla sobre los involucros (oricios) de las castañas (*Castanea sativa*)....

Muy corriente en nuestra región....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lanzia-echinophila.html>

### *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murrill

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas), de unos 30 cm de diámetro. Suelen aparecer varios sombreros imbricados, alargados, imbricados, ...

Crece sobre árboles caducifolios, a los que provoca una pudrición que acaba con la vida del árbol...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/laetiporus-sulphureus.html>

### *Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.) Pat.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 1.5 a 10 cm de diámetro, convexo o embonado, carnoso, de textura ate...

Crece en verano y otoño en suelos baldíos, jardines, campos, cultivos abandonados, bordes de caminos y escombreras....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lacrymaria-lacrymabunda.html>

### *Lachnum virgineum* (Batsch) P. Karst.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos, apotecios, con forma de copa de 2 - 3 mm, blanquecinos y estipitados provistos de abundantes pelos marginales...

Crece en madera muerta, tallos de plantas herbáceas e incluso piñas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lachnum-virgineum.html>



## *Hyphodermella corrugata* (Fr.) J. Erikss. & Ryvar den

Hongo que se desarrolla extendido sobre el sustrato, resupinado, con un himenio con dentículos o papilas ciliadas (peniciladas) que, microscópicamente...

Sobre madera en descomposición....

Abundante...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hyphodermella-corrugata.html>

## *Hygrocybe pratensis* (Fr.) Murrill

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 30 a 120 mm de diámetro, al principio hemisférico, plano convexo o anchamente cónico, más tarde al envejece...

Crece en prados de siega o diente y en claros de bosques de planifolios a finales de otoño e invierno....

Es común en Europa y se ha citado en Norteamérica, Sudamérica, Japón, Nueva Guinea y África....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-pratensis.html>

## *Hygrocybe konradii* R. Haller Aar.

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 25 - 45 mm de diámetro, cónico obtuso, campanulado, plano - convexo, con un umbo de agudo a anchamente obtu...

Crece en laderas calcáreas y zonas herbosas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-konradii.html>

## *Hygrocybe conicoides* (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling

Macroscopía. Fructificaciones con un sombrero de 20 - 35 mm, cónico, cónico - obtuso, cónico - convexo, plano - convexo, con un marcado umbo, higrófan...

Vive en suelos arenosos y dunas fijadas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-conicoides.html>

## *Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm.



Macroscopía. Fructificaciones con un sombrero de 3 a 100 mm, al principio estrechamente cónico, más tarde expandido, con un umbo, a menudo con el marg...

Crece en verano y otoño en prados, bosques húmedos, bordes de caminos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-conica.html>

## *Hygrocybe calyptriformis* (Berk.) Fayod

Macroscopía: sombrero de 20 a 70 mm, al principio estrechamente cónico, irregularmente lobulado, para volverse más tarde expandido, roto, con un umbo ...

Es una especie que crece en prados no abonados durante el otoño, naturales, por lo que es raro al encontrarse la mayoría de los mismos nitrificados de...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-calyptiformis.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Amanita caesarea* (Scop.) Pers. (Basidiomycota)

*Amanita citrina* var. *alba* (Basidiomycota)

*Amanita crocea* (Quél. in Bourdot) Singer (Basidiomycota)

*Amanita gemmata* (Fr.) Bertill. (Basidiomycota)

*Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Link (Basidiomycota)

*Amanita virosa* Lamkey (Basidiomycota)

*Ascobolus stercorarius* (Ascomycota)

*Clavulina cristata* (Fr.) J. Schröt. (Basidiomycota)

*Crepidotus luteolus* (Lamotte) Sacc. (Basidiomycota)

*Crepidotus variabilis* (Pers.) P. Kumm. (Basidiomycota)



*Elaphomyces muricatus* Fr. (Ascomycota)

*Exidia truncata* Fr. (Basidiomycota)

*Galerina laevis* (Pers.) Singer (Basidiomycota)

*Hygrocybe calyptriformis* (Berk. & Broome) Fayod (Basidiomycota)

*Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. (Basidiomycota)

*Lachnum virgineum* (Batsch) P. Karst. (Ascomycota)

*Lanzia echinophila* (Bull.) Korf (Ascomycota)

*Lophodermium arundinaceum* (Schrad.) Chevall. (Ascomycota)

*Marasmius limosus* Quél. (Basidiomycota)

*Morchella esculenta* (L.) Pers. (Ascomycota)

*Mycena pura* (Pers.) P. Kumm. (Basidiomycota)

*Ombrophila violacea* Fr. (Ascomycota)

*Pilobolus longipes* Tiegh. (Zygomycota)

*Psathyrella ammophila* (Durieu & Lév.) P. D. Orton (Basidiomycota)

*Schizophyllum commune* Fr. (Basidiomycota)

*Tuber aestivum* Vittad. (Ascomycota)

*Ustilago maydis* (DC.) Corda (Basidiomycota)

