



Num. 109. Publicado el 08/01/2007

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Hippocrepis commutata*. Por José Luis Porto Torres



Num. 109. Publicado el 08/01/2007

Descripciones de especies

Morchella esculenta (L.) Pers.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (ascomas) bastante llamativos por su forma. El sombrero es ovalado, con cierta tendencia a una globosidad, de...

Nace de finales de marzo a mediados de mayo, según los años. Su óptimo se produce entre el 1 y el 15 de abril, donde habita generalmente en las orilla...

Zona templada del hemisferio norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/morchella-esculenta.html>

Marasmius limosus Boud. & Quéf.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de 0.75 - 2.5 mm de diámetro, de color gris parduzco, estriado, que al ...

Vive en los tallos, vainas y hojas del carrizo (*Phragmites australis*) y alguna otra monocotiledónea, durante la mayor parte del año pero más frecuente...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/marasmius-limosus.html>

Marasmius androsaceus (L.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de aproximadamente 1 cm de diámetro, estriado y asurcado de forma radia...

Crece sobre restos de madera y hojas en descomposición, tanto de coníferas como de planifolios....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/marasmius-androsaceus.html>

Marasmiellus candidus (Bolton) Singer

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero pubescente y seco de 1 - 2 cm de diámetro, hemisférico, aplanado, rizad...

Crece sobreramitas de planifolios, tallos herbáceos y semileñosos como los de las zarzas muertas en lugares húmedos y sombríos de los bosques....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/marasmiellus-candidus.html>

Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 5 - 12 cm de diámetro, al principio globoso que al ir madurando se h...

Crece durante el otoño en claros forestales o prados cercanos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/macrolepiota-mastoidea.html>

Lycoperdon mammiforme Pers.

Macroscopía. Fructificaciones generalmente piriformes, anchamente turbinadas, capituladas - pseudoestipitadas, de 3 - 4 x 4 - 6 cm, con una papila o u...

Aparece en verano en bosques de frondosas, como robledales y hayedos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lycoperdon-mammiforme.html>

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chevall.

Hongo que aparece como manchas negras elípticas, alargadas, que surgen fuera del tallo u hoja en el que viven por una rajadura longitudinal del mismo....

Vive sobre hojas y tallos muertos de monocotiledóneas, especialmente juntos pero también es abundante en gramíneas....

Ampliamente distribuido en Europe, América del norte y África del norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lophodermium-arundinaceum.html>

Leucoagaricus leucothites (Vittad.) M.M. Moser ex Bon

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero liso y mate, al principio acampanado y luego convexo, de 5 - 10 cm de d...

Crece en prados, jardines, bordes de cultivos, entre verano y otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leucoagaricus-leucothites.html>



Lepista nuda (Bull.) Cooke

Macroscopía. Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas) llamativos por su color azul violáceo de jóvenes. Su sombrero, de 3 - 15 cm...

Crece desde finales de verano hasta invierno en zonas variadas, como bosques, prados, matorrales e incluso parques y jardines...

Cosmopolita...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lepista-nuda.html>

Lentinus tigrinus (Bull.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos con un sombrero de 4 - 7 cm de diámetro, delgado, elástico, umbilicado, de color blanquecino sobre el que des...

Crece durante el verano y otoño sobre troncos viejos y tocones de sauces preferentemente, aunque puede crecer también sobre alisos y hayas...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lentinus-tigrinus.html>

Novedades corológicas

Pellidiscus pallidus (Berk. & Broome) Donk (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 07/01/2007

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pellidiscus-pallidus-berk-broome-donk/1488.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Antirrhinum braun-blanquetii Rothm. (Magnoliophyta)

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quéf. (Basidiomycota)

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. in Sacc. (Ascomycota)

Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Crepis pygmaea L. (Magnoliophyta)

Hygrocybe konradii R. Haller Aar. (Basidiomycota)



Hyphodermella corrugata (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden (Basidiomycota)

Lamprospora dictydiola Boud. (Ascomycota)

Leucoscypha leucotricha (Alb. & Schwein.) Boud. (Ascomycota)

Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer (Basidiomycota)

Marasmiellus candidus (Bolton) Singer (Basidiomycota)

Omphalina galericolor (Romagn.) Bon (Basidiomycota)

Parascutellinia violacea (Velen.) Svrček (Ascomycota)

Pellidiscus pallidus (Berk. & Broome) Donk (Basidiomycota)

Phallus hadriani Vent. (Basidiomycota)

Pholis gunnelus (Chordata)

Vincetoxicum hirundinaria Medik. (Magnoliophyta)

Xanthium strumarium subsp. italicum (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008