



## Num. 11. Publicado el 21/02/2005

La revista online *asturnatura.com* es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Coprotus lacteus*. Por Enrique Rubio Domínguez



## Num. 11. Publicado el 21/02/2005

### Descripciones de especies

#### *Spirographis spallanzani* Viviani, 1805

Cuerpo de 20 - 30 cm de longitud, con una corona de branquias tentaculares asimétrica en individuos adultos, formada por una rama larga de 10 - 15 cm,...

Sublitoral, en profundidades bajas o medias, fuertemente fijado a rocas o sustratos más blandos....

Desde el Canal de la Mancha al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/spirographis-spallanzani.html>

#### *Prostheceraeus vittatus* (Montagu, 1813)

Cuerpo de 3 cm de longitud, aplanado, con forma de hoja y cola puntiaguda. Los márgenes laterales se curvan hacia arriba y están generalmente doblados...

Se encuentra reptando bajo piedras o entre algas, en zonas con sedimentos, hasta los 10 m de profundidad....

Atlántico E y Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/prostheceraeus-vittatus.html>

#### *Phyllodoce lamelligera* (Linnaeus, 1791)

Poliqueto largo y delgado, que alcanza los 60 cm de longitud. Su cabeza es alargada, con forma de cono truncado, con 2 ojos negros, 4 antenas y 4 cirr...

Bajo piedras grandes y bloques, en zonas poco profundas, a menudo en rizoides de kelps....

Desde el O de las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phyllodoce-lamelligera.html>

#### *Pennatula phosphorea* Linnaeus, 1758

Colonia con forma de pluma, de 20 - 40 cm de longitud. El eje central, delgado y flexible, es un pólipo axial que sirve de soporte a la colonia, de co...



Sublitoral, desde 20 m de profundidad, en lugares con sedimentos....

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pennatula-phosphorea.html>

## *Neanthes virens* (Sars, 1835)

Poliqueto delgado, de 20 - 40 cm de longitud. Cabeza con dos palpos ovoides, cada uno con dos estructuras terminales en forma de botón. Entre estos ha...

En sustratos arenosos o fangosos de aguas poco profundas, a menudo se le encuentra nadando....

Desde Noruega a Portugal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/neanthes-virens.html>

## *Lineus longissimus* (Gunnerus, 1770)

Gusano acintado extremadamente largo, de 5 - 15 m de longitud y 1 - 10 mm de ancho, dependiendo de su grado de contracción. Cabeza espatulaza, con 10 ...

Bajo piedras, entre rocas, barro, arena o sedimentos de conchas. También en estipes de algas....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lineus-longissimus.html>

## *Corynactis viridis* Allman, 1846

Pólipos solitarios pequeños y de colores brillantes, rosas, rojos o verdosas, que se encuentran agrupados en densos grupos. Los pólipos son bastante r...

Desde la franja infralitoral hasta los 100 m en costas rocosas....

Desde el O de las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/corynactis-viridis.html>

## *Aphrodita aculeata* Linnaeus, 1761

Cuerpo oval, de 10 - 20 cm de longitud y 3 - 7 cm de ancho, con la superficie dorsal convexa y la ventral plana, fácil de identificar por la densa



mat...

Raro en el intermareal, más común en el sublitoral sobre sustrato blando, arena o barro....

Desde Noruega al Mediterráneo, no muy abundante....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aphrodita-aculeata.html>

## *Alcyonium palmatum* Pallas, 1766

Pólipos embebidos en una masa de color blanco, rosado, roja o pardo que posee un esqueleto calcáreo que forma gruesos lóbulos carnosos. Estos corales ...

Especie sublitoral, en aguas poco profundas, adherido a piedras o conchas sobre sustratos fangosos hasta los 90 m de profundidad....

Desde el Canal de la Mancha al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/alcyonium-palmatum.html>

## *Aglaophenia pluma* (Linnaeus, 1758)

Colonia semejante a plumas erectas de unos 8 cm de alto unidas por estolones ramificados, algunos de hasta 15 cm por tener ramificaciones dicótomas. E...

En aguas poco profundas, hasta 20 metros de profundidad, en sustratos rocosos, verticales o cuevas, también en algas pardas como Halydris y más rare...

Desde Escocia al sur de África, también en el Mediterráneo. Es una especie cosmopolita....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aglaophenia-pluma.html>

ISSN 1887-5068

