



## Num. 114. Publicado el 12/02/2007

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Senecio aquaticus*. Por César Fernández González



**Num. 114. Publicado el 12/02/2007**

## Descripciones de especies

*Xerocomus pulverulentus* (Opat.) E.-J. Gilbert

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 4 - 8 cm de diámetro, primero amarillento y luego manchado de ocre y...

Vive en verano y otoño en bosques de caducifolios o mixtos....

Por [asturnatura.com](http://asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/xerocomus-pulverulentus.html>

*Ulex europaeus* L.

Planta espinosa, de 60 - 200 cm de altura, con los tallos principales erectos o ascendentes, muy ramificados en las zonas más jóvenes pero no en las m...

Crece en brezales, setos y orlas espinosas de bosques desde el nivel del mar a los 1300 m. Es una planta muy variable dependiendo de las condiciones a...

Aparece en el O y SO de Europa, y está naturalizada, donde es una planta invasora, en América, S de África y Australia. En España se encuentra en la z...

Por [asturnatura.com](http://asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ulex-europaeus.html>

*Suillus grevillei* (Klotzsch) Singer

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 5 - 15 cm, liso, viscoso, umbonado o cónico, con un color amarillo ...

Forma micorrizas exclusivas con árboles del género *Larix* (alerces)....

Por [asturnatura.com](http://asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/suillus-grevillei.html>

*Sterna dougallii* Montagu, 1813

Mide unos 38 centímetros y muestra una envergadura de unos 75-80 cm. Es muy parecido al charrán ártico, del que se diferencia porque las plumas de la ...

Como los demás charranes, lo podemos ver en la costa, en playas, puertos, estuarios, etc. Es una especie muy escasa, difícil de ver. En la península



i...

Presente sólo en núcleos de reproducción aislados. Actualmente se reproducen únicamente en núcleos de las Islas Británicas y en la Bretaña Francesa y ...

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sterna-dougallii.html>

## *Rivularia bullata*

Alga verde azulada que forma colonias firmes al principio hemisféricas, pero que luego se vuelven al crecer muy irregulares, con la superficie llena d...

Crece en rocas del intermareal superior...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rivularia-bullata.html>

## *Lunularia cruciata*

Hepática de talo verde brillante o amarillo verdoso de hasta 5 cm de longitud y 1 cm de anchura, que forma extensos tapices donde vive. En la parte ve...

Especie bastante frecuente en zonas húmedas con aportes nitrogenados....

Abundante en toda Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lunularia-cruciata.html>

## *Glechoma hederacea* L.

Planta perenne de hasta 50 cm de longitud, subglabra o pubescente, con tallos floríferos erectos o ascendentes y los estériles reptantes y enraízantes....

Crece en lugares frescos y sombríos, de suelo húmedo, como alisedas, robledales, setos y márgenes de prados, desde el nivel del mar a los 1100 m. Es c...

Presente en la mayor parte de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/glechoma-hederacea.html>

## *Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758)

El petirrojo es un ave muy conocida, de unos 15 cm de longitud y 21 de envergadura, de cuerpo rechoncho, especialmente durante el invierno,



cuando, pa...

El petirrojo es un ave muy abundante. Habita en bosques frondosos y húmedos, donde haya abundante sotobosque. Muy frecuente en parques y jardines, nor...

Distribuido por toda Europa excepto Islandia y norte de Fenoscandia, y norte de África....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erithacus-rubecula.html>

## *Chalciporus piperatus* (Bull.) Bataille

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero carnoso de 3 - 7 cm, de color ocre, leonado, canela, con la superficie ...

Crece durante otoño en en suelos herbosos de bosques de coníferas y planifolios....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chalciporus-piperatus.html>

## *Arion ater* (Linnaeus, 1758)

Se trata de la babosa terrestre más común, que puede alcanzar 15 - 18 cm de longitud, de color pardo, rojo pardusco, verde pardusco o negro, pudiendo ...

Es una especie nocturna que vive en zonas herbosas, en zonas de suelo húmedo y fresco. Es omnívora, come carroña, estiércol y cualquier otra materia v...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arion-ater.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Balsamia polysperma* Vittad. (Ascomycota)

*Bisporella citrina* (Batsch) Korf & S. E. Carp. (Ascomycota)

*Boletus calopus* Pers. (Basidiomycota)

*Chalciporus piperatus* (Bull.) Bataille (Basidiomycota)

*Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse ex C. S. Ramamurthi, Korf & L. R. Batra (Ascomycota)



*Chondrostereum purpureum* (Pers.) Pouzar (Basidiomycota)

*Helleborus foetidus* L. (Magnoliophyta)

*Motacilla alba* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Strobilomyces strobilaceus* (Scop.) Berk. (Basidiomycota)

*Suillus grevillei* (Klotzsch) Singer (Basidiomycota)

*Xerocomus pulverulentus* (Opat.) E.-J. Gilbert (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008