



## **Num. 116. Publicado el 26/02/2007**

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Dosinia lupinus*. Por César Fernández González



**Num. 116. Publicado el 26/02/2007**

## Descripciones de especies

### *Viscum album* L.

Planta perenne hemiparásita y dioica, de aspecto globoso, con tallos de hasta 100 cm, amarillo verdosos y formados por artejos cilíndricos. Tienen hoja...

Parasita árboles planifolios como Prunus, Crataegus, Malus, Pyrus, Sorbus, Robinia, Populus y también de Pinus y Abies, entre otros, desde 50 a 1300 m...

Aparece en la mayor parte de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/viscum-album.html>

### *Vandenboschia speciosa* (Willd.) Kunkel

Planta perenne provista de un rizoma largo, postrado - radicante, delgado, de cerca de 3 mm de diámetro y generalmente tomentoso. Las frondes están es...

Crece en roquedos y muros silíceos umbríos y rezumantes en ambientes boscosos ribereños. Aparece en las siguientes comunidades: Es una planta caracterí...

Costas atlánticas europeas, Macaronesia, alcanzando puntualmente Italia. Sus poblaciones en la Península son muy escasas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vandenboschia-speciosa.html>

### *Tuber melanosporum* Vittad.

Uno de los hongos más valorados por su valor culinario. Este hongo forma unas fructificaciones (o ascomas) enterrados, de forma irregular, globosa u o...

Crece enterrada en zonas generalmente calizas, bien drenadas y de clima continental, micorrizando árboles como encinas, robles o avellanos a unos 5 - ...

Presente en el NO, Levante y zona central de España, que junto con Francia e Italia forma el trío de los principales países productores de dicho hongo...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tuber-melanosporum.html>



## *Ruscus aculeatus* L.

Arbusto perenne con tallos de entre 10 y 100 cm de altura y con 7 - 20 ramas. Las hojas caulinares son muy pequeñas, escariosas, pero hay ramas modific...

Crece en matorrales, bosques y zonas dunares o acantilados en ocasiones....

Extendida por el W, S y SC de Europa, hasta las Islas Británicas y C de Hungría. En la Península Ibérica presente en casi todas las provincias....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ruscus-aculeatus.html>

## *Phycopeltis arundinacea* (Montagne) De Toni

Alga verde que forma parches discoidales anaranjados sobre plantas superiores, de hasta 1.5 mm de diámetro, de contorno redondeado y margen entero o l...

Crece sobre plantas, principalmente hiedra (*Hedera helix*), laurel cerezo (*Prunus laurocerasus*), acebo (*Ilex aquifolium*), y helechos como *Phyllitis sco...*

Es una especie quizás cosmopolita, pero hoy día, en Europa, sólo se ha encontrado en el Reino Unido, Francia y el Norte de España, concretamente algun...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phycopeltis-arundinacea.html>

## *Passer domesticus*

Es un pájaro pequeño, rechoncho, de unos 15 centímetros de longitud. Los machos se caracterizan por tener la garganta negra durante la época de celo y...

Están en casi todo el mundo, siempre cerca de los hombres: ciudades, pueblos, e incluso aldeas; evitando los bosques. Es en general sedentario, aunque...

Está distribuido casi por todo el mundo, desde Cabo Norte hasta la periferia de los desiertos....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/passers-domesticus.html>

## *Origanum vulgare* L.

Planta perenne aromática, con tallos de hasta 90 cm, erectos o decumbentes, de sección cuadrangular y pelosos y ramificación opuesta. Las hojas, de 10...

Crece en pastizales, matorrales, pedregales, orlas de encinares, en zonas secas y soleadas, generalmente en calizas donde se localiza cerca de donde s...



Presente en la mayor parte de Europa hasta el N y O de Asia...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/origanum-vulgare.html>

## *Lepista panaeolus* (Fr.) P. Karst.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 4 - 8 cm de diámetro, primero convexo y luego plano y abierto, con l...

Crece formando "corras" (líneas, círculos que dejan la hierba más verde que el resto del prado) en suelos herbosos tanto de la costa como de la montaña...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lepista-panaeolus.html>

## *Boletus calopus* Pers.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 5 - 20 cm de diámetro, al principio hemisférico y al madurar convexo...

Crece durante el otoño en bosques acidófilos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/boletus-calopus.html>

## *Anas crecca* Linnaeus, 1758

Es un pato muy pequeño, el más pequeño de los patos de superficie, con tan sólo unos 37 centímetros de longitud. El macho en periodo nupcial es inconf...

Está muy ampliamente distribuido. En la península ibérica es un invernante muy común que aparece en prácticamente todos los tipos de agua dulce. Cría ...

Toda Eurasia y Norteamérica. Hay quien cree que la raza americana es una especie diferente....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anas-crecca.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Hygrocybe helobia* (Arnolds) Bon (Basidiomycota)



*Hypholoma polytrichi* (Fr.) Ricken (Basidiomycota)

*Hypholoma sublateritium* (Schaeff.) Quél. (Basidiomycota)

*Nectria fuckeliana* C. Booth (Ascomycota)

*Peziza varia* (Hedw.) Fr. (Ascomycota)

*Plectania melastoma* (Sowerby) Fuckel (Ascomycota)

*Procambarus clarkii* (Girard, 1852) (Arthropoda)

*Setulipes quercophilus* (Pouzar) Antonín (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008