



Num. 117. Publicado el 05/03/2007

La revista online *asturnatura.com* es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Calycellina leucella*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 117. Publicado el 05/03/2007

Descripciones de especies

Tortula muralis Hedw.

Musgo que aparece con frecuencia, formando céspedes almohadillados. Las plantas miden 3 - 5 mm de altura, son de color verde, con tonos glaucos a vece...

Uno de los musgos más frecuentes, crece sobre rocas, calizas principalmente; es capaz de resistir la contaminación, por lo que también es posible enco...

Cosmopolita....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tortula-muralis.html>

Phycopeltis epiphyton Millardet

Alga verde que forma parches discoidales anaranjados, verdes, pardo amarillentos o dorados, sobre plantas superiores, de hasta 1 mm de diámetro, de co...

Crece sobre plantas, principalmente hiedra (*Hedera helix*), laurel cerezo (*Prunus laurocerasus*), y helechos como *Hymenophyllum*....

Es una especie quizás cosmopolita, pero hoy día, en Europa, sólo se han encontrado muy escasas poblaciones en el Reino Unido, Alemania y el Norte de E...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phycopeltis-epiphyton.html>

Phoenicurus ochruros (SG Gmelin, 1774)

Pájaro pequeño, de unos 15 centímetros de longitud, caracterizado por su cola de color rojo. Machos de color negro durante el verano y con manchas al...

Habitual en costas rocosas. Frecuenta regiones rocosas, alta montaña, y últimamente cada vez más frecuente en zonas urbanas, parques y jardines. Es un ...

Se encuentra en casi toda Europa excepto Islandia. Está también ausente de Irlanda....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phoenicurus-ochruros.html>

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)



Águila de unos 60 centímetros de longitud, algo mayor que un ratonero, con una envergadura alar que puede llegar a los 165 centímetros. El dorso es de...

En España sólo hay unas 14-16 parejas que crían en roquedos y en ocasiones en árboles de las Baleares y las Islas Chafarinas, y 10 parejas en las isla...

Podemos encontrarla en Norteamérica, Eurasia, Oceanía y Australia. Ausente en la zona central de Europa debido a la presión que ha sufrido....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pandion-haliaetus.html>

Lepista glaucocana (Bres.) Singer

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 6 - 12 cm de diámetro, que al principio es convexo y luego se hace p...

Crece en bosques, principalmente de planifolios, desde fin de verano a otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lepista-glaucocana.html>

Helleborus foetidus L.

Planta perenne, de olor desagradable, provista de una cepa leñosa vertical de la que surgen tallos de hasta 80 cm, erectos, persistentes y recios, con...

Aparece en zonas luminosas, creciendo sobre suelos secos, poco nitrificados y protegidos del viento, en pastizales, matorrales, orlas de bosques, como...

Aparece en el O y S de Europa y el N de Marruecos; en la Península en la mayor parte de las provincias....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/helleborus-foetidus.html>

Grateloupia doryphora (Montagne) M.A. Howe

Alga roja que se fija al sustrato por medio de un disco basal de 1 - 3 mm de diámetro del que surge en ocasiones un estipe de hasta 25 mm, de color ve...

Crece zonas expuestas y semiexpuestas al oleaje, sobre roca y mejillones en charcas rocosas y profundas del intermareal superior y medio, junto con Li...

Desde las Islas Británicas a Portugal y Ghana....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/grateloupia-doryphora.html>

Geastrum triplex Jungh.



Hongo de forma característica, ya tiene su pared o peridio formado por una envoltura doble; al principio están cerradas y permanece medio enterrado, p...

Crece durante el otoño en zonas de suelo arenoso de bosques....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/geastrum-triplex.html>

Clitocybe fragrans Sowerby

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), de 3 a 6 cm de diámetro, al principio hemisférico pero que pronto se hace deprimido, um...

Aparece bajo árboles planifolios y coníferas, en zonas húmedas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/clitocybe-fragrans.html>

Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C. S. Ramamurthi & al.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos, ascomas, con forma de copa de hasta 3 mm de diámetro, provistas de un corto pedicelo, flexibles, más o menos...

Crece sobre madera muerta de planifolios, en tiempo húmedo, y es característico el color verde azulado que adquiere debido al micelio del hongo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chlorociboria-aeruginascens.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anthracobia macrocystis (Cooke) Boud. (Ascomycota)

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Cerrena unicolor (Bull.) Murrill (Basidiomycota)

Cortinarius torvus (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

Entoloma euchroum (Pers.) Donk (Basidiomycota)

Entoloma sericeum (Bull.) Quél. (Basidiomycota)



Galerina marginata (Batsch) Kühner (Basidiomycota)

Melastiza scotica (Ascomycota)

Nezara viridula Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. (Basidiomycota)

Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fuckel (Ascomycota)

Urnula rhytidia (Berk.) Cooke (Ascomycota)

