



## Num. 12. Publicado el 28/02/2005

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: . Por Juan Luis Menéndez



## Num. 12. Publicado el 28/02/2005

### Descripciones de especies

#### *Serpula vermicularis* Linnaeus, 1767

Cuerpo delgado, pálido, de 5 - 7 cm de longitud, formado por 200 segmentos con sedas, 7 de ellos torácicos. Cabeza con dos coronas de branquias, cada ...

En aguas poco profundas, sobre piedras, rocas, conchas viejas, en zonas calmadas....

Cosmopolita....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/serpula-vermicularis.html>

#### *Sabella pavonina* Savigny, 1820

Anélido de cuerpo delgado, de 25 - 30 cm de longitud y 4 mm de diámetro, aplanado ventralmente, y con 300 segmentos de los cuales 8 - 16 son torácicos...

Sobre barro y arena en la zona infralitoral....

Toda la costa europea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sabella-pavonina.html>

#### *Patina pellucida* Linnaeus

Concha de 15 mm de longitud, fina, suave y de color ambar, casi translúcida, con líneas azules que radian desde el ápice y se van apagando con la edad...

En costas rocosas expuesta hasta los 30 metros, casi siempre en frondes y estipes de Laminaria, donde excavan agujeros al alimentarse....

Desde Noruega a Portugal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/patina-pellucida.html>

#### *Lepidonotus clava* (Montagu, 1808)

Cuerpo de anchura uniforme, de 25 - 30 cm de longitud y aplanado. Cabeza parcialmente oculta, con 2 pares de ojos, 3 antenas, un par de palpos largos ...



Se encuentra en el intermareal bajo, entre rocas y piedras....

Desde el Canal de la Mancha y O de las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lepidonotus-clava.html>

## *Hediste diversicolor* (Müller, 1776)

Poliqueto delgado, de 12 cm de longitud, con 90 - 120 segmentos. Cabeza con dos palpos ovoides, cada uno con dos estructuras terminales en forma de bo...

En el mediolitoral y sublitoral, excavando en arena y fango en aguas generalmente salobres....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hediste-diversicolor.html>

## *Eunereis longissima* (Johnston, 1840)

Poliqueto delgado, de 50 cm de longitud. Cabeza con dos palpos ovoides, cada uno con dos estructuras terminales en forma de botón. Entre estos hay un ...

En fondos de sedimentos de aguas poco profundas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eunereis-longissima.html>

## *Eulalia viridis* (Linnaeus, 1767)

Distintivo gusano de 5 - 15 cm de longitud, con 60 - 200 segmentos. Prostomio triangular redondeado, tan largo como ancho, con cinco antenas medias en...

Vive en la zona infralitoral, y a veces en la intermareal, donde se le puede ver entre piedras con marea baja. También es posible encontrarla en los r...

Hemisferio Norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eulalia-viridis.html>

## *Bispira volutacornis* (Montagu, 1804)

Cuerpo de unos 10 cm de longitud y 1 de ancho. Cabeza reducida, con dos palpos cortos y branquias arrolladas en hélice, formadas por unos 200 tentáculos...



En charcas profundas en el intermareal, bajo salientes de rocas; en aguas poco profundas. A menudo forma colonias....

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bispira-volutacornis.html>

## *Arenicola marina* (Linnaeus, 1758)

Anélido marino con el cuerpo formado por 3 partes diferentes, de unos 11 - 20 cm de longitud. La parte anterior con 6 segmentos engrosados con sedas, ...

Vive excavando en la arena en aguas poco profundas. Son característicos los cordones de arena que deja en la superficie; el gusano excava agujeros com...

Desde Noruega al Mediterráneo, abundante en el Cantábrico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arenicola-marina.html>

## *Acanthus mollis* L.

Hierba perenne de 30-70 cm, más o menos pelosa o glabra. Hojas basales 20-100 x 5-20(30) cm, elípticas u ovadas, pinnatífidas, inciso-dentadas, glabras...

Forma parte de comunidades nitrófilas y umbrófilas, especialmente ruderales, en suelo húmedo; 0-700 m....

Aparece en el C y E de la región mediterránea; cultivada y naturalizada en otras zonas. Difundida principalmente en el E, S y W de la Península Ibéri...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/acanthus-mollis.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Caryophyllia inornata* (Cnidaria)

*Phorbas fictitius* (Porifera)

*Rhodophyllis divaricata* (Rhodophyta)

