



Num. 121. Publicado el 02/04/2007

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Triphragmium ulmariae*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 121. Publicado el 02/04/2007

Descripciones de especies

Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766)

Mide unos 12-13 de longitud. El macho presenta un plumaje inconfundible, con toda la cabeza negra, el cuello blanco por los lados durante el verano y ...

Les gustan las zonas húmedas, en las que haya matorrales. El nido lo construye la hembra, y lo hace en el suelo o a muy poca altura, en los matorrales...

Presente en el centro-sur de Europa y gran parte de África....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxicola-torquatus.html>

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

Mide unos 12-13 de longitud, al igual que la tarabilla común. Cabeza de color negro, pero presentando una lista supraocular blanca muy vistosa. El pec...

Frecuenta las zonas húmedas, al igual que la tarabilla común, y también prefiere la presencia de matorrales. La hembra construye el nido muy oculto en...

Presente en el norte de Europa, teniendo su límite de distribución en el norte de la Península Ibérica....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxicola-rubetra.html>

Quercus suber L.

Árbol de talla mediana, robusto, de hasta 20 m de altura y con copa amplia. Su corteza, el corcho, es suberosa, gruesa y bastante agrietada, es de col...

Crece en las partes bajas de valles internos sobre suelos profundos y bien drenados, sobre sustratos silíceos. Forma parte de las comunidades correspo...

Aparece en el occidente de la Región Mediterránea, desde Portugal hasta el sudeste de Italia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/quercus-suber.html>

Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link



Planta anual, bienal o perenne, glabra o casi en la inflorescencia. Los tallos, de 10 - 40 cm, simples, de procumbentes a erectos, con hojas de 5 - 30...

Se encuentra en las comunidades pertenecientes al Orden Crucianelletalia maritimae (Clase Ammophiletea), de escasa cobertura, dominadas por caméfito...

Endemismo de las costas atlánticas de la Península Ibérica y Francia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/linaria-polygalifolia.html>

Linaria arenaria DC

Planta anual cuyos tallos, de ascendentes a erectos y ramificados desde la base, alcanzan entre 5 y 15 cm y son densamente pelosos - glandulosos.

Las ...

Vive sobre dunas y arenas relativamente asentadas. Planta de pastizales pioneros, no le perjudica una alteración ligera del terreno (bordes de camino...

Presente en la costa occidental de Francia y Galicia (NO Península Ibérica). En Galicia vive en tres localidades insulares, dos en Pontevedra (Illa de...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/linaria-arenaria.html>

Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de 5 - 10 cm de diámetro, carnoso, hemisférico al principio y luego con...

Crece en grupos sobre tocones, raíces muertas, en grupos de varios individuos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hypholoma-lateritium.html>

Hydnотrya tulasnei (Berk.) Berk. & Broome

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos hipógeos, de 3 - 6 cm de diámetro, esféricos, lobulados, con cierto aspecto cerebriforme; son de color de ama...

Prefiere suelos ácidos bajo castaños (*Castanea sativa*), robles (*Quercus robur*) y hayas (*Fagus sylvatica*)....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hydnотrya-tulasnei.html>

Gentiana pneumonanthe L.



Planta perenne, glabra, con tallos acostados que pueden alcanzar los 20 cm de longitud; son angulosos, con dos canales opuestos y crestas finamente de...

Vive en brezales y pastizales acidófilos encharcados, como tojales, turberas y cervunales, en zonas iluminadas y poco nitrificadas. Desde el nivel del...

Aparece principalmente en la zona norte de la Península...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gentiana-pneumonanthe.html>

Cortinarius torvus (Fr.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de 3 - 9 cm de diámetro, hemisférico y de borde incurvado al principio ...

Aparece en bosques de planifolios, especialmente hayedos, durante verano y otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-torvus.html>

Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar

Hongo que aparece incrustado en la madera, de unos 2 - 3 cm de diámetro, a veces solapados varios individuos. La parte superior, que contacta con la m...

Crece sobre ramas, ya estén muertas o vivas, causando en este último caso graves enfermedades a frutales....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chondrostereum-purpureum.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (Magnoliophyta)

Gentiana pneumonanthe L. (Magnoliophyta)

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. (Magnoliophyta)

Linaria arenaria DC (Magnoliophyta)

Pezicula eucrita P. Karst. (Ascomycota)



Pulsatilla rubra Delarbre (Magnoliophyta)

Pyrenopeziza plantagini Fuckel (Ascomycota)

Quercus suber L. (Magnoliophyta)

Tapesia strobilicola (Ascomycota)

Tremella encephala Pers. (Basidiomycota)

Tremella foliacea Pers. (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008