



## Num. 122. Publicado el 09/04/2007

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Crocicreas tomentosum*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 122. Publicado el 09/04/2007**

## Descripciones de especies

### *Rana temporaria* Linnaeus, 1758

Se trata de una rana que alcanza gran tamaño, sobre todo las hembras que por lo general son mayores que los machos, así estas pueden medir 7 centímetros...

Muy frecuente. Presente en lagos, lagunas, arroyos, prados encharcados, turberas, etc. y con un muy amplio rango de altitud en su distribución, así pu...

Se encuentra en toda Europa occidental hasta el Cabo Norte, y en Asia llega hasta el Japón....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rana-temporaria.html>

### *Pulmonaria longifolia* (Bast.) Boreau

Planta perenne, rizomatosa, con tallos simples de los que surgen hojas de 50 x 6 cm, estrechamente lanceoladas, que se estrechan gradualmente en la ba...

Aparece en prados umbrosos, taludes, en bordes de hayedos, cantiles, crestones, etc, desde el nivel del mar hasta los 1600 m de altitud....

Oeste y S de Europa. N y C de la Península Ibérica, más algunas localidades dispersas en el S...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pulmonaria-longifolia.html>

### *Parus cristatus* Linnaeus, 1758

Pájaro pequeño, de unos 11 centímetros de longitud. Se distingue con facilidad gracias a una llamativa cresta, de color blanco grisáceo y con rayado ...

Habitual en bosques de frondosas y coníferas. La época de cría está entre abril y mayo, en la que realiza normalmente una sola puesta. El nido lo sit...

Presente en casi toda Europa. No se reproduce en Italia, Grecia y resto de países mediterráneos (excepto España), Islandia, y norte de Fenoscandia, as...

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/parus-cristatus.html>

### *Lygaeus equestris* (Linnaeus, 1758)



Chinche que de adulta alcanza los 8 - 14 mm de longitud. Es de forma oval alargada y de color llamativo, rojo y negro; su cabeza es roja y negra, pata...

Vive en céspedes pobres, claros de bosques, matorrales, escombreras, en zonas generalmente calizas. Las larvas y los imagos se alimentan de gran número...

Frecuente en zonas cálidas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lygaeus-equestris.html>

## *Lactarius atlanticus* Bon

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 4 - 7 cm de diámetro, convexo, aplanado, con la superficie mate, más...

Crece bajo encinas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-atlanticus.html>

## *Inachis io* (Linnaeus, 1758)

Mariposa fácil de reconocer por su destacado colorido; sus alas tienen una envergadura de 52 - 58 mm, siendo la hembra mayor que el macho. En el borde...

Aparece en gran cantidad de hábitats, desde el nivel del mar a los 2500 m de altitud. Vuela desde febrero a mayo (ejemplares invernantes) y de junio a...

Especie frecuente, que aparece por toda Europa, hasta los 60° de latitud norte. En la Península Ibérica está distribuida principalmente por la zona no...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/inachis-io.html>

## *Frangula alnus* Mill.

Arbusto o pequeño árbol que alcanza hasta los 4 m de altura. El tronco y las ramas tienen la corteza de color pardo - negruzca. Las ramas son glabras,...

Aparece en bosques acidófilos, como robledales y abedulares, pinares, en zonas próximas a ríos, en zonas iluminadas, como claros y orlas en suelos húm...

Europa, desde el sur de Escandinavia y Siberia y los Urales hasta el norte de África....

Por asturnatura.com



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/frangula-alnus.html>

## *Digitalis parviflora* Jacq.

Planta anual o bienal con tallos de entre 30 y 60 cm de altura, angulosos, de pubescente a glabra en la parte inferior y más o menos tomentosa en la p...

Aparece en matorrales, pastizales y roquedos calcáreos, aunque en ocasiones aparece en sustratos algo ácidos, en zonas soleadas y poco nitrificadas, d...

Endémica de las montañas del norte de la Península Ibérica....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/digitalis-parviflora.html>

## *Cortinarius trivialis* J.E. Lange

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero viscoso de 5 - 10 cm de diámetro, más o menos cónico - umbonado, con un...

Bajo árboles planifolios....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-trivialis.html>

## *Bisporella citrina* (Batsch) Korf & S.E. Carp.

Macroscopía. Apotecios discoidales o ligeramente cupulados, sésiles o cortamente estipitados, de hasta 2 - 3 mm, de color amarillo limón a anaranjado,...

Crece sobre ramas caídas desprovistas de corteza de planifolios, especialmente hayas (*Fagus sylvatica*), durante verano y otoño....

Aparece ligada principalmente a zonas donde se encuentran hayas, por lo que es más frecuente en la parte septentrional de la Península Ibérica....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bisporella-citrina.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Acrospermum compressum* Tode (Ascomycota)

*Clitocybe sinopica* (Fr.) P. Kumm. (Basidiomycota)



*Frangula alnus* Mill. (Magnoliophyta)

*Henningsomyces candidus* (Pers.) Kuntze (Basidiomycota)

*Hyaloscypha britannica* Huhtinen (Ascomycota)

*Lophodermium conigenum* (Brunaud) Hilitzer (Ascomycota)

*Lygaeus equestris* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Melastiza chateri* (W. G. Sm.) Boud. (Ascomycota)

*Morchella esculenta* var. *umbrina* (Ascomycota)

*Oxalis acetosella* L. (Magnoliophyta)

*Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Quél. (Basidiomycota)

*Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Parus ater* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Parus caeruleus* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Parus cristatus* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Rana temporaria* Linnaeus, 1758 (Chordata)

ISSN 1887-5068



9 771887506008