



Num. 123. Publicado el 16/04/2007

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Scleroderma meridionale*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 123. Publicado el 16/04/2007

Descripciones de especies

Rana iberica Boulenger, 1879

Es la mas pequeña de las ranas de este género en España. Los machos son algo menores que las hembras, así los machos miden entre 30 y 40 milímetros, m...

Se encuentra en orillas de ríos, regatos, arroyos, etc. También en prados húmedos. Son activas tanto de día como de noche, siempre dependiendo de las ...

Es endémica de la Península Ibérica. Presente en el norte de Portugal, Galicia (donde parece ser bastante abundante), Cordillera Cantábrica, Sistema C...

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rana-iberica.html>

Periparus ater

Es un párido muy pequeño, de unos 11 centímetros de longitud. Tiene al igual que el carbonero común la cabeza negra con las mejillas blancas. El pecho...

Presente en bosques caducifolios, mejor si son espesos. Frecuente en pinares. El nido lo sitúa en agujeros, normalmente a escasa altura. Muy frecuente...

Toda Europa y norte de África. Ausente en Islandia, norte de Fenoscandia y oeste de Rusia...

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/periparus-ater.html>

Oxalis purpurea L.

Hierba hasta de 3-6,5(15) cm, bulbosa, sin tallos aéreos, pelosa -pelos simples, no septados-. Bulbo de 17-20(30) x 8-15 mm, ovoide o estrechamente ov...

Ruderal, en huertas, jardines, en suelos removidos; 0-600 m. ...

Originaria de África del Sur, hoy asilvestrada en América del Norte, Oceanía y Europa. En el NW y W de la Península Ibérica. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/oxalis-purpurea.html>

Oxalis pes-caprae L.



Hierba hasta de 40 cm, bulbosa, sin tallos aéreos, esparcidamente pelosa -con pelos glandulíferos en pedicelos y sépalos-. Bulbo de 10-15 x 6-11 mm, o...

Ruderal, en cultivos -olivares, almendrales, cítricos, etc.- abandonados, cañaverales, parterres, jardines, en suelos removidos, más o menos húmedos; ...

Originaria de la región del Cabo -África del Sur-, como asilvestrada, hoy subcosmopolita. Mala hierba escapada probablemente de los jardines, en la Pe...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/oxalis-pes-capraeae.html>

Oxalis corniculata L.

Hierba hasta de 30 cm, con tallos aéreos bien desarrollados, pelosa -pelos simples, no septados, excepto a veces en los frutos y muy raramente en los ...

Ruderal, en cultivos, cunetas, grietas de paredes y aceras, parterres, etc.; 0-1500(1600) m....

Se ha sugerido un posible origen en el SE de Asia y Oceanía, prácticamente subcosmopolita. Casi toda la Península Ibérica y Baleares -ligada a zonas c...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/oxalis-corniculata.html>

Oxalis acetosella L.

Hierba hasta de 14 cm, rizomatosa, sin tallos aéreos, ligeramente pelosa -pelos simples, no septados-. Rizoma ramificado, delgado, con numerosas escam...

Bosques húmedos y umbríos -hayedos, alisedas, robledales, etc.-, brezales, pedregales con megaforbias, etc.; 20-1980(2050) m....

Propia de las regiones boreales templadas, vive en casi toda Europa -excepto las zonas más mediterráneas-, gran parte de Asia -desde los Urales y NO d...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/oxalis-acetosella.html>

Lepista sordida (Fr.) Singer

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 4 - 10 cm de diámetro, al principio convexo pero que aparece extendi...

Crece durante el otoño formando grupos en jardines, campos y zonas abonadas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lepista-sordida.html>



Lactarius torminosus (Schaeff.) Gray

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 8 - 12 cm, carnoso, con el centro deprimido y viscoso, el margen enr...

Aparece en bosques de planifolios, preferentemente zonas herbosas junto a abedules, durante verano y otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-torminosus.html>

Inocybe asterospora Quéél.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de 4 - 6 cm de diámetro y umbonado, de color pardo castaño en el centro...

Crece bajo planifolios....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/inocybe-asterospora.html>

Aquilegia vulgaris subsp. *vulgaris* L.

Planta perenne, que crece de una cepa leñosa y sus tallos alcanzan los 30 - 70 cm, de subglabros a ligeramente glandular - pubescentes. Las hojas basal...

Crece en claros y orlas de bosques, como robledales, hayedos, castañares, abedulares,... en suelos ligeramente ácidos. Es posible encontrarla también en...

Presente en el oeste, centro y sur de Europa, alcanzando el O de Ucrania....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aquilegia-vulgaris-subsp-vulgaris.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calloria neglecta (Lib.) B. Hein (Ascomycota)

Calocybe gambosa (Fr.) Donk (Basidiomycota)

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Cistella aconiti (Rehm) Raitv. & Järv (Ascomycota)



Dacrymyces stillatus Nees (Basidiomycota)

Disciotis venosa (Pers.) Boud. (Ascomycota)

Geopora sumneriana (Cooke) M. Torre (Ascomycota)

Iris latifolia (Mill.) Voss (Magnoliophyta)

Pieris napi (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Rosellinia franciscae L. E. Petrini (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008