



## **Num. 144. Publicado el 10/09/2007**

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Odontitella virgata*. Por José Luis Porto Torres



**Num. 144. Publicado el 10/09/2007**

## Descripciones de especies

### *Mentha pulegium* L.

Planta perenne, de 10 - 40 cm, de subglabra a tomentosa, con tallos de procumbentes a ascendentes que surgen de rizomas reptantes. Las hojas, glabras, ...

Crece en praderas, matorrales o claros de bosques, en zonas con marcada humedad edáfica, por lo que suele aparecer cerca de arroyos, ríos, charcas o e...

Aparece en toda Europa y por toda la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mentha-pulegium.html>

### *Jurinea humilis* (Desf.) DC.

Planta perenne, acaule o con tallos de 5 - 10 cm, con un grueso rizoma que además de tallos floríferos puede producir otros estériles. Las hojas, entre...

Crece en crestones y pastos pedregosos venteados, desde los 800 a los 1900 m de altitud....

Es un endemismo mediterráneo occidental, cuya área de distribución va desde el N de África hasta el S de Francia. En la Península Ibérica crece en la ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/jurinea-humilis.html>

### *Hypericum perforatum subsp. perforatum* L.

Planta perenne que emite tallos semileñosos, de hasta 100 cm de altura, de sección circular pero con 2 pequeñas alas en los entrenudos que van alterna...

Planta arvense, ruderal, viaria, en orlas forestales herbáceas, pastizales y prados subnitrófilos, ribazos, etc., en substratos variados, desde el ni...

Ampliamente distribuido por Europa y la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-perforatum-subsp-perforatum.html>

### *Cynosurus echinatus* L.

Planta anual con tallos de 20 - 60 cm, lisos. Las hojas, de 3 - 9 mm de anchura, son aplanadas, con el haz glabro o escábrido, con una vaina lisa y



l...

Crece en campos de cultivo y zonas abiertas, desde el nivel del mar a los 1800 m de altitud. Es característica de comunidades ruderales subnitrófilas ...

Presente en el sur de Europa, se naturaliza en el centro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cynosurus-echinatus.html>

## *Centaurea cyanus* L.

Planta anual, rara vez bianual, con tallos erectos, ramificados, de 20 - 80 cm. Las hojas son flocosas en el envés y glabrescentes; las inferiores son...

Crece en zonas secas y abiertas y se naturaliza en campos de cereales, desde los 2500 a los 1000 m de altitud. Es característica de comunidades perten...

Aparece en el SE de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-cyanus.html>

## *Centaurea calcitrapa* L.

Planta bianual, con tallos de 20 - 100 cm, de ascendentes a erectos, ramificados de forma divaricada desde la base. Las hojas jóvenes son grisáceas y l...

Crece en zonas alteradas. Es una planta característica de comunidades pertenecientes a la subclase Onopordenea acanthii (Clase Artemisietea vulgaris),...

Presente en el sur de Europa y naturalizada en la zona oeste....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-calcitrapa.html>

## *Carex remota* L.

Planta perenne muy cespitosa provista de un rizoma del que surgen tallos fértiles de hasta 50 cm de longitud, de contorno trígono, lisos o algo escábr...

Crece en alisedas ribereñas y zonas húmedas de hayedos, desde el nivel del mar a los 1800 m de altitud. Es una planta característica de comunidades pe...

Presente en toda Europa, en la Península abunda en la parte norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-remota.html>



## *Carex pendula* Huds.

Planta perenne, provista de un rizoma robusto, no reptante y densamente cespitoso, provisto de entrenudos cortos. Los tallos alcanzan los 60 - 150 cm,...

Crece en alisedas ribereñas, desde el nivel del mar a los 1200 m de altitud....

Presente en la mayor parte de Europa, excepto en el extremo N, y en la Península bastante abundante aunque en el centro hay zonas que carecen de esta ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-pendula.html>

## *Carduncellus mitissimus* (L.) DC.

Planta perenne, generalmente acaule, aunque en ocasiones tiene un corto tallo de hasta 20 cm. Hojas subglabras y blandas, que se disponen formando una ...

Crece en pastos secos o frescos, tomillares, matorrales abiertos, crestones venteados, pedregales, ... en sustratos calizos o margosos, desde los 10 a...

Presente en el sur de Francia y norte de España....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carduncellus-mitissimus.html>

## *Aconitum vulparia subsp. neapolitanum* (Ten.) Muñoz Garm.

Planta perenne provista de un rizoma fibroso del que surgen tallos de hasta 2 m, provistos de un indumento de pelos aplicados o patentes. Las hojas so...

Crece en zonas frescas, húmedas y umbrosas desde los 500 a los 3000 m de altitud....

Aparece en toda Europa, y en la Península principalmente en el centro y norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aconitum-vulparia-subsp-neapolitanum.html>

## **Novedades corológicas**

### *Lophodermium juniperinum* (Fr.) De Not. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 05/09/2007

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lophodermium-juniperinum-fr-de-not-1/3386.html>



## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Cakile maritima* subsp. *integrifolia* (Magnoliophyta)

*Carlina acaulis* L. (Magnoliophyta)

*Elaphomyces septatus* Vittad. (Ascomycota)

*Gibberella cyanogena* (Desm.) Sacc. (Ascomycota)

*Lophodermium juniperinum* (Fr.) De Not. (Ascomycota)

*Maniola jurtina* subsp. *hispula* (Arthropoda)

*Odontites asturicus* (M. Laínz) M. Laínz (Magnoliophyta)

*Phalaris canariensis* (Magnoliophyta)

*Phyteuma orbiculare* L. (Magnoliophyta)

*Rosa villosa* L. (Magnoliophyta)

*Russula lepida* (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

*Scutellinia umbrorum* (Fr.) Lambotte (Ascomycota)

ISSN 1887-5068

