



Num. 146. Publicado el 24/09/2007

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Peziza varia*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 146. Publicado el 24/09/2007

Descripciones de especies

Vicia bithynica (L.) L.

Planta trepadora anual, con tallos erectos a ascendentes de 20 - 60 cm, tetragonos; es glabra o subglabra, con pelos erectos de hasta 1 mm. Las hojas,...

Crece en zonas ruderales, como bordes de camino, y también en herbazales húmedos, desde el nivel del mar a los 850 m de altitud. Es una planta caracte...

Presente en el sur y oeste de Europa; en la Península generalmente en las zonas costeras del norte, este y oeste....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vicia-bithynica.html>

Urtica dioica L.

Planta perenne, dioica y urticante, con tallos de hasta 150 cm, escasamente ramificados; en los nudos tienen 4 estípulas libres, de 1 - 2 mm, de forma ...

Crece en zonas ruderales, viarias, zonas húmedas costeras, nitrificadas y arcillosas, desde los 100 a los 2500 m de altitud....

Cosmopolita en la región templada....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/urtica-dioica.html>

Polygonum bistorta L.

Planta perenne, herbácea, provista de un rizoma carnoso y retorcido, del que surgen hasta 6 tallos de hasta 80 cm de altura, erectos, no ramificados y...

Crece en herbazales megafórbicos, prados húmedos, en suelos ricos en humus, desde los 880 a los 2350 m de altitud....

Presente en toda Europa, en la Península aparece en la Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sistemas Ibérico y Central....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polygonum-bistorta.html>

Lonicera periclymenum L.

Planta arbustiva trepadora de hasta 5 m, glabra o algo pubescente o glandular - pubescente. Las hojas, enteras y sin estípulas, son glabras o algo pube...



Crece en zonas ácidas en zarzales y comunidades arbustivas riparias, generalmente umbrosas, desde los 50 a los 1200 m de altitud....

Presente en el O, SO y S de Europa; en la Península está ampliamente distribuida....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lonicera-periclymenum.html>

Kickxia elatine (L.) Dumort.

Planta anual, de glandular - pubescente a hirsuta, con tallos ramificados desde la base. Las hojas son alternas, ovadas, sagitadas o hastadas, con un ...

Crece en campos de cultivos abandonados, cunetas, en zonas también inundadas en ocasiones, preferentemente en sustrato calizo, desde el nivel del mar ...

Aparece en la mayor parte de Europa, excepto en el extremo norte. En la Península es más frecuente en la parte norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/kickxia-elatine.html>

Coronopus didymus (L.) Sm.

Planta bianual con tallos de hasta 40 cm, prostrados o procumbentes, glabros o con pelos no ramificados que surgen de una gruesa raíz axonomorfa. Las h...

Crece en zonas nitrificadas, como cunetas, bordes de caminos, en suelos arcillosos, y arenas, desde el nivel del mar a los 700 m de altitud. Es caract...

Originaria de Sudamérica, se naturaliza en la mayor parte de Asia y Europa. Presenta un comportamiento invasor incipiente en España (Península e isla...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coronopus-didymus.html>

Carlina vulgaris L.

Planta biannual con tallos de 10 - 70 cm, subglabros o con indumento aracnoide disperso, simples o ramificados. Las hojas, de hasta 15 cm, son de lan...

Crece en pastos mesófilos, resaltes rocosos, pies de cantiles, en zonas termófilas, secas y soleadas, desde loa 200 a los 1600 m de altitud. Es caract...

Aparece en toda Europa, excepto en el extremo norte. Originaria del oeste de Asia, se cultivó para la obtención de tintes....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carlina-vulgaris.html>

Carduus nutans L.



Planta perenne, con tallos de hasta 150 cm, cubiertos de una pilosidad más o menos araneosa, con alas de hasta 10 mm y una espina apical de hasta 8 mm...

Crece en ambientes ruderales, como cunetas, cultivos abandonados, reposaderos de ganado, en zonas frescas nitrogenadas, desde los 600 a los 1900 m de ...

Aparece en el centro y oeste de Europa, siendo en la Península frecuente en las zonas montañosas del norte y centro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carduus-nutans.html>

Campanula glomerata L.

Planta perenne provista de un rizoma algo leñoso del que surgen tallos de hasta 40 cm, simples o algo ramificados, erectos, pubescentes, hispídeos o su...

Crece en pastos, orillas de ríos y herbazales mesohigrófilos, desde el nivel del mar a los 2200 m de altitud. Es característica de comunidades de la C...

Aparece en la mayor parte de Europa excepto en la zona norte; en la Península en la Cornisa Cantábrica, Pirineos y Sistemas Central e Ibérico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/campanula-glomerata.html>

Campanula arvatica subsp. arvatica Lag.

Planta perenne de hasta 40 cm, glabra en el ápice, cespitosa, provista de un rizoma ramificado, grueso, con restos de hojas y peciolos, del que surgen...

Crece en grietas, fisuras y repisas de roquedos calizos, desde los 500 a los 2000 m de altitud. Es una planta característica de comunidades de la alia...

Endémica de la Cordillera cantábrica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/campanula-arvatica-subsp-arvatica.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Hydnum rufescens Pers. (Basidiomycota)

Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr. (Basidiomycota)



Lactarius controversus Pers. (Basidiomycota)

Lycoperdon pyriforme Schaeff. (Basidiomycota)

Polygonum bistorta L. (Magnoliophyta)

Uromenus Rugosicollis (Arthropoda)

Vicia bithynica (Magnoliophyta)

