



Num. 15. Publicado el 21/03/2005

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Encoelia fuckelii*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 15. Publicado el 21/03/2005

Descripciones de especies

Spisula solida (Linnaeus, 1758)

Concha triangular de hasta 4.5 cm de longitud, gruesa, con estrías de crecimiento y sin estrías radiales. Charnela heterodonta, valva izquierda con 3 ...

Sublitoral, enterrada en arena y grava, hasta 100 metros....

Desde Noruega a Portugal y Marruecos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/spisula-solida.html>

Polycera quadrilineata (Muller, 1776)

Cuerpo de hasta 4 cm de longitud, con 4 papilas o tubérculos frontales, raramente 6, al final del velo, y otras 2 en cada uno de los dos repliegues do...

En la zona intermareal y aguas poco profundas, hasta los 60 m, en costas rocosas. Se alimenta de briozoos incrustantes, como *Membranipora membranacea*....

Desde Islandia al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polycera-quadrilineata.html>

Mytilus edulis (Linnaeus, 1758)

Concha de 1 - 10 cm de longitud, con umbos prominentes, terminales y aguzados y el borde de la concha no los rodea; ésta tiene anillos concéntricos, c...

Forma densos grupos desde el mediolitoral hasta el infralitoral. En piedras y rocas, fijada al sustrato por el biso....

Toda la costa europea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mytilus-edulis.html>

Mimachlamys varia (Linnaeus, 1758)

Concha de hasta 6 cm de longitud, ovalada, con valvas convexas casi iguales, la superior más abombada. Entre 25 y 35 costillas radiales marcadas, que ...



Intermareal, hasta 100 metros de profundidad. En rocas o piedras, algas de gran talla, fijada por el biso, o libre....

Desde las Islas Británicas a la costa oeste de África, incluido el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mimachlamys-varia.html>

Hypselodoris cantabrica Bouchet & Ortea, 1980

Nudibranquio de color de fondo azul, de hasta 110 mm de longitud. El borde del manto es de color amarillo. Presenta una línea media amarilla (blanca e...

Desde el intermareal a los 25 m de profundidad. Los juveniles se encuentran frecuentemente sobre la esponja *Dysidea fragilis*....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hypselodoris-cantabrica.html>

Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758)

Concha equivalva, de unos 6 cm de largo y casi circular, pesada. Borde de la valva inferior dentado, y charnela taxodonta, con dos filas de unos 12 di...

En sedimentos, hasta 80 - 100 metros....

Desde Noruega hasta el O de África, también en el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/glycymeris-glycymeris.html>

Doriopsilla areolata Bergh, 1880

Nudibranquio de unos 40 mm de longitud, con cuerpo y manto de color variable, desde blanco cremoso, translúcido a naranja brillante y pardo en los adu...

Se encuentra generalmente sobre *Spirastrella cuncatrix*, esponja de la que se alimenta....

Desde la costa atlántica francesa al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/doriopsilla-areolata.html>

Diaphorodoris luteocincta (Sars, 1870)

Nudibranquio de hasta 11 mm de longitud, de forma ovalada. El manto está cubierto de tubérculos prominentes y cónicos. El final del manto es translúci...



Sublitoral, alimentándose de briozoos como *Smithoidea reticulata*, *Cellepora pumicosa* y *Crisia*....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/diaphorodoris-luteocincta.html>

Berthellina edwardsi Vayssière, 1876

Opistobranquio de 4 - 6 cm de longitud, de cuerpo hinchado, de color naranja rojizo algo transparente. Posee concha interna, tentáculos orales lisos, ...

En aguas poco profundas, hasta los 10 m. Se alimenta de ascidias....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/berthellina-edwardsi.html>

Aplysia punctata (Cuvier, 1803)

Cuerpo carnoso, abultado, que alcanza los 20 cm, pero que generalmente no pasa de 10 cm. Tiene cuatro tentáculos cefálicos, dos de ellos rinóforos enr...

En el sublitoral, entre algas, en aguas someras....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aplysia-punctata.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Balistes carolinensis Gmelin, 1789 (Chordata)

Berghia coerulescens (Mollusca)

Botrylloides leachi (Urochorda)

Flabellina pedata (Montagu, 1815) (Mollusca)

Haliclona cinerea (Grant, 1826) (Porifera)

Scomber scombus Linnaeus, 1758 (Chordata)



Spongia officinalis Linnaeus, 1758 (Porifera)

