



Num. 155. Publicado el 26/11/2007

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Ascozonus woolhopensis*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 155. Publicado el 26/11/2007

Descripciones de especies

Uromyces trifolii-repentis Liro

Hongo de tipo roya, con un ciclo vital complejo, formado por 5 fases que se desarrollan todas en el mismo huésped. Estas fases son las siguientes: Los ...

Parasita diferentes especies de tréboles, en especial *Trifolium repens*...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/uromyces-trifolii-repentis.html>

Trifolium repens L.

Planta perenne provista de un estolón, glabra excepto en los pedicelos, pedúnculos y pecíolos. De estos estolones surgen tallos de hasta 60 cm que enr...

Crece en prados de siega, en bordes de arroyos y fuentes, desde el nivel del mar a los 2400 m. Es característica de comunidades vegetales pertenecient...

Aparece en toda Europa, y en la Península dispersa por todas las regiones....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-repens.html>

Stellaria media (L.) Vill.

Planta anual o bienal, con tallos de hasta 20 cm, postrados, difusos o erectos, con una línea de pelos que alternan de posición en los entrenudos. Las ...

Crece en zonas ruderalizadas, desde el nivel del mar a los 2100 m de altitud....

Especie cosmopolita, está muy repartida por toda la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stellaria-media.html>

Stellaria graminea L.

Planta herbácea perenne que tiene en la base un delgado rizoma muy ramificado, del que surgen tallos de hasta 50 cm, ascendentes, ramificados y de sec...

Crece en claros, taludes y zonas herbosas cerca de arroyos, alisedas, fuentes, en parajes húmedos y sombríos, desde el nivel del mar a los 2200 m de



a...

Aparece en toda Europa, y en la Península lo hace en la mitad norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stellaria-graminea.html>

Puccinia menthae Pers.

Hongo de tipo roya, con un ciclo vital complejo, formado por 5 fases que se desarrollan todas en el mismo huésped. Estas fases son las siguientes: Los ...

Parasita diferentes especies de labiadas, en especial las pertenecientes a los géneros Calamintha, Mentha, Clinopodium, Nepeta, Origanum y Satureja....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-menthae.html>

Polystichum lonchitis (L.) Roth

Planta perenne, provista de un grueso rizoma cubierto de páleas del que surgen frondes de entre 15 y 30 cm, de consistencia rígida, persistentes y fas...

Crece en las grietas y gleras de zonas montañosas, desde los 1000 a más de 3000 m de altitud. Es característica de comunidades pertenecientes al orden...

Ampliamente distribuido en el hemisferio norte, en la Península aparece en las zonas de montaña....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polystichum-lonchitis.html>

Phialina ulmariae (Lasch) Dennis

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos, ascomas, de hasta 0.5 mm de diámetro, sésiles o subsésiles, con el himenio de color amarillo o ámbar cuando ...

Crece sobre tallos muertos de Filipendula ulmaria, aunque rara vez se ha visto sobre Epilobium....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phialina-ulmariae.html>

Iberis carnososa Willd.

Planta perenne, con tallos de unos 15 cm, arqueados o ascenentes. Las hojas, con cilios en el peciolo y más rara vez en el limbo; las basales, de 10
-...



Crece en canchales, gleras y pedreros calizos, desde los 800 a los 1500 m de altitud. ...

Presente en la Europa Mediterránea, en la Península aparece en la parte norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/iberis-camosa.html>

Eruca vesicaria (L.) Cav.

Planta anual, con tallos de 20 a 100 cm de altura, hispida, olorosa y ramificada. Las hojas, de lirado - pinnatífidas a pinnatisectas, en ocasiones bip...

Crece en campos abandonados, barbechos, en zonas ruderalizadas, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud....

Presente en el sur de Europa, en la Península aparece por todas las regiones aunque en algunas del norte y oeste falta....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eruca-vesicaria.html>

Coprinus romagnesianus Singer

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 3 - 6 cm de diámetro, subgloboso, elipsoidal u ovoide, que se expand...

Crece junto a árboles....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coprinus-romagnesianus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Coprinus romagnesianus Singer (Basidiomycota)

Eruca vesicaria (L.) Cav. (Magnoliophyta)

Geastrum campestre Morgan (Basidiomycota)

Polystichum lonchitis (L.) Roth (Pteridophyta)

Trifolium repens L. (Magnoliophyta)

Uromyces trifolii-repentis (Castagne) Liro (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068

