



Num. 156. Publicado el 03/12/2007

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Sagina merinoi*. Por José Luis Porto Torres



Num. 156. Publicado el 03/12/2007

Descripciones de especies

Pyrenopeziza digitalina (W. Phillips) Sacc

Hongo que forma cuerpos fructíferos o ascomas de hasta 1.5 mm de diámetro, sésiles, con forma de disco, errumpentes, que tienen la parte fértil o hime...

Crece cerca de la base de la dedalera (*Digitalis purpurea*)...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pyrenopeziza-digitalina.html>

Papaver rhoeas L.

Planta anual de 10 - 60 cm de altura, hispida, con tallos erectos o ascendentes y más o menos ramosos provistos de látex. Las hojas, de 2 - 12 x 0.5 - ...

Es una planta ruderal o viaria, que crece en cultivos, rastrojos, barbechos, que aparece desde el nivel del mar a los 1900 m. Es una planta caracterís...

Aparece en Europa, Asia, Japón y N de África. En la Península aparece en todas las provincias...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/papaver-rhoeas.html>

Nealbionella longicaudata

Como sucede con el resto de géneros de esta Familia, esta especie presenta un acusado dimorfismo sexual, siendo las hembras mucho más grandes y de dif...

No se conoce gran cosa de su ecología, salvo que se supone que se alimenta de los tejidos superficiales de su hospedador y del mucus que los recubre, ...

Se trata de una especie muy poco frecuente, que hasta el momento solo ha sido citada tres veces a nivel mundial (en Islandia en 1923 -descripción de l...

Por FERNÁNDEZ, Casto

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/neoalbionella-longicaudata.html>

Laccaria tortilis (Bolton) Cooke

Hongo que forma cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 1 - 2 cm de diámetro, desfigurado por lo general, con el margen



estriado ...

Crece en lugares húmedos...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/laccaria-tortilis.html>

Hypericum androsaemum L.

Planta sufruticosa, glabra, de hasta 1.2 m, que carece de las glándulas negras, rojas o amarillas de otras especies del género. Los tallos jóvenes tie...

Aparece en las riberas, barrancos, setos, bosques, en zonas generalmente umbrosas y frescas, desde el nivel del mar a los 1600 m de altitud....

Aparece en el oeste y sur de Europa, Anatolia, Caucasia, N del Irán, O de Siria, Túnez y Argelia. Regiones periféricas de la mitad N de la Península...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-androsaemum.html>

Globularia nudicaulis L.

Planta perenne de hasta 15 cm, sin estolones pero con la cepa leños, con hojas más o menos erectas, de 6 - 12 cm, dispuestas en la base del tallo, gla...

Crece en matorrales, repisas sombrías, pastos montanos y subalpinos, tanto en calizas como en esquistos o pizarras, desde los 300 a los 2200 m de alti...

Aparece en los Alpes, Pirineos y montes del NE de España....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/globularia-nudicaulis.html>

Erodium cicutarium (L.) LHér.

Planta anual, robusta, algo fétida, con tallos de hasta 100 cm, pelosa, eglandular o algo glandular. Las hojas son opuestas, de hasta 15 cm, pinnadas, ...

Forma parte de comunidades de terófitos ruderales que crecen en cunetas de carreteras y caminos, claros de matorrale, pastizales secos y degradados, e...

Ampliamente extendido por Europa y la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erodium-cicutarium.html>

Epilobium hirsutum L.



Planta perenne, erecta, con los tallo de 30 - 150 cm, de sección cuadrangular o circular y con la ramificación opuesta, muy profusa en la mitad superi...

Crece en los márgenes de arroyos, regatos, aguas estancadas, en zonas generalmente húmedas y nitrificadas, como pueden ser también cunetas algo enchar...

Aparece en la mayor parte de Europa, al igual que en la Península, si bien en la cornisa cantábrica es más escasa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/epilobium-hirsutum.html>

Coprinus stercoreus

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de hasta 7 x 5 mm cuando está cerrado al principio, pero que luego se a...

Crece sobre excrementos de diversos animales....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coprinus-stercoreus.html>

Ceratias holboelli Kroyer, 1845

Ceratias holboelli es una especie de aguas relativamente profundas, que presenta un marcado dimorfismo sexual, con hembras de gran tamaño (hasta 120 c...

Se encuentra en aguas relativamente profundas (150 - 3400 m) y su biología se desconoce casi completamente. Su reproducción es ovípara, surgiendo el hu...

Aunque su distribución geográfica es muy amplia, se encuentra en todos los océanos, en el hemisferio norte, su densidad de población es muy escasa, ha...

Por FERNÁNDEZ, Casto

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ceratias-holboelli.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Albionella longicaudata (Hansen, 1923) (Arthropoda)

Anelasma squalicola (Arthropoda)

Battarrea stevenii (Libosch.) Fr. (Basidiomycota)



Ceratias holboelli (Chordata)

Erodium cicutarium (L.) L.'Hér. (Magnoliophyta)

Melilotus officinalis (L.) Pall. (Magnoliophyta)

Neoalbionella longicaudata (Hansen, 1923) (Arthropoda)

Reddellomyces donkii (Malençon) Trappe, Castellano & Malajczuk (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008