



Num. 159. Publicado el 24/12/2007

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Branta ruficollis*. Por César Fernández González



Num. 159. Publicado el 24/12/2007

Descripciones de especies

Urtica membranacea Poir.

Planta anual, de 15 - 80 cm, monoica, urticante. Las hojas, opuestas, de 2 - 6 cm, ovadas, con la base subcordada, margen serrado, un peciolo casi tan ...

Se trata de una planta ruderal, que crece en zonas muy nitrogenadas como cultivos, campos, terrenos baldíos, en zonas umbrosas y húmedas, desde el niv...

Aparece en la Región Mediterránea, y en la Península está bastante dispersa en las provincias litorales....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/urtica-membranacea.html>

Senecio jacobaea L.

Planta bianual o perenne, con tallos de 30 - 150 cm, de subglabros a flocosos, sólo ramificados en la inflorescencia. Las hojas son alternas; las basal...

Crece en zonas alteradas, como cunetas, huertas, campos abandonados, taludes, claros de bosques, en zonas de suelo húmedo y nitrificadas por la presen...

En Europa sólo no se encuentra en el norte y en las zonas secas de Grecia y la Península. En este último lugar, falta en las zonas del S y SE, además ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/senecio-jacobaea.html>

Scrophularia scorodonia L.

Planta perenne, más o menos pubescente, con tallos de 25 - 100 cm, erectos o ascendentes, de sección cuadrangular y no alados. Las hojas, opuestas, de...

Crece en zonas alteradas, como cunetas de caminos, terrenos removidos, orillas de ríos y también en algunos prados. Se encuentra en comunidades perten...

Presente en el oeste de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scrophularia-scorodonia.html>



Puccinia chrysanthemi Roze

Hongo de tipo roya que se desarrolla sobre dos huéspedes diferentes y tiene un ciclo vital complejo, formado por las siguientes 4 fases: Los espermogon...

Crece parasitando especies cultivadas de *Chrysanthemum*....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-chrysanthemi.html>

Phragmidium fragariae G. Winter

Hongo de tipo roya que se desarrolla sobre dos huéspedes diferentes y tiene un ciclo vital complejo, formado por las siguientes 5 fases: Los espermogon...

Crece sobre diferentes especies de rosáceas del género *Potentilla*, como *Potentilla montana* y *Potentilla sterilis*....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phragmidium-fragariae.html>

Melampsora lini (Ehrenb.) Lév.

Hongo de tipo roya que se desarrolla sobre dos huéspedes diferentes y tiene un ciclo vital complejo, formado por las siguientes 5 fases: Los espermogon...

Parasita diferentes especies del género *Linum*, existiendo diferentes variedades según la especie....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/melampsora-lini.html>

Lysimachia nemorum L.

Planta perenne, herbácea y glabra, provista de un rizoma del que surgen tallos de hasta 45 cm, erectos o procumbentes, ramificados en la parte superior...

Crece en hayedos, robledales, en zonas húmedas y umbrosas, en suelos ácidos o calizos descarboxilados. Es característica de comunidades vegetales pert...

Aparece en el oeste y centro de Europa; en la Península en los Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sistema Central....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lysimachia-nemorum.html>

Lophodermium aucupariae (Schleich.) Darker

Hongo que produce cuerpos fructíferos bajo la epidermis de hojas y peciolo del serbal, que cuando maduran se abren mediante una grieta



brevemente lon...

Crece en hojas y peciolo de *Sorbus aucuparia*, el serbal de los cazadores....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lophodermium-aucupariae.html>

Gymnopus brassicolens (Romagn.) Antonín & Noordel.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 2 - 4 cm de diámetro, que están estriados por transparencia; son muy...

Relativamente común sobre ramitas muertas de planifolios diversos, madera en general, hojas muertas y otros restos vegetales....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gymnopus-brassicolens.html>

Cucurbitaria berberidis (Pers.) Grev.

Hongo que forma cuerpos fructíferos o ascomas cuyos pseudotecios están inmersos en la corteza de las plantas en las que vive; son errumpentes, negruzcos...

Crece en tallos muertos del agracejo, *Berberis vulgaris*....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cucurbitaria-berberidis.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ascozonus woolhopensis Renny (Boud.) (Ascomycota)

Calycellina albida (Grelet & Croz.) R. Galán & G. Moreno (Ascomycota)

Macrocystidia cucumis (Pers.) Joss. (Basidiomycota)

Melampsora lini (Ehrenb.) Lév. (Basidiomycota)

Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer (Basidiomycota)

Puccinia punctata Link (Basidiomycota)



Rumex obtusifolius L. (Magnoliophyta)

Scrophularia scorodonia L. (Magnoliophyta)

Stereum illudens Berk. (Basidiomycota)

Trichophaea hemisphaerioides (Mouton) Graddon (Ascomycota)

Urtica membranacea Poir. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008