



## Num. 16. Publicado el 28/03/2005

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Salix triandra*. Por César Fernández González



**Num. 16. Publicado el 28/03/2005**

## Descripciones de especies

### *Venerupis pullastra* (Montagu, 1803)

Concha oval, algo trapezoidal, de hasta 5 cm de longitud. Estrías de crecimiento marcadas que se cruzan con costillas finas. Charnela heterodonta, con...

Enterrada en fondos de arena o grava hasta los 180 m....

De Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/venerupis-pullastra.html>

### *Venerupis decussata* (Linnaeus, 1758)

Concha de forma oval, de hasta 6 - 7 cm de longitud. Superficie de las valvas con un entramado reticular marcado especialmente en la zona posterior, c...

Enterrado en fondos arenosos o fangosos....

Desde el O de las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/venerupis-decussata.html>

### *Pecten maximus* (Linnaeus, 1758)

Concha grande, de 13 - 15 cm de longitud. Las valvas son diferentes, siendo la inferior (derecha) plana, y la superior (izquierda) convexa. Ambas está...

Vive en fondos arenosos o de grava, hasta los 100 metros....

Desde Noruega a Portugal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pecten-maximus.html>

### *Pecten jacobaeus* (Linnaeus, 1758)

Semejante a *Pecten maximus*. Concha de hasta 13 cm de longitud, con la valva inferior aplanada y la superior convexa. Presentan costillas radiales, de ...



Fondos de arena o grava, en aguas profundas....

Desde Noruega a Portugal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pecten-jacobaeus.html>

## *Ostrea edulis* (Linnaeus, 1758)

Concha inequivalva, redondeada, de hasta 10 cm de longitud, la inferior plana, en forma de plato, muy esculpida y generalmente fijada a rocas; la supe...

Infralitoral, hasta 80 metros, fijada a rocas. Concha frecuentemente colonizada por otros organismos....

Desde Noruega a Marruecos y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ostrea-edulis.html>

## *Dosinia exoleta* (Linnaeus, 1758)

Molusco bivalvo con una concha casi circular, de 5 - 6 cm de longitud, inequilateral, con los umbos pequeños pero diferenciables, justo en posición an...

En sedimentos, hasta 100 m de profundidad....

Desde el sur de Noruega al norte de África, también en el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dosinia-exoleta.html>

## *Crassostrea gigas* (Lamarck, 1819)

Concha bastante grande, de 10 - 15 cm de longitud, alargada, ovalada, con valvas foliosas, desiguales: la interior profunda y más larga que la superio...

Adherida a rocas y piedras en el sublitoral, hasta unos 80 m de profundidad, en aguas calmadas y generalmente cerca de la superficie. Es filtradora....

En toda Europa. Especie invasora, autóctona del SE asiático, incluido Japón, desde donde fue importada, primero a Portugal a principios de 1900 para se...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/crassostrea-gigas.html>

## *Cerastoderma edule* (Linnaeus, 1758)



Concha ovalada, abombada, de unos 5 cm de longitud. La concha presenta 24 costillas más o menos escamosas, con líneas de crecimiento concéntricas, que...

Desde la franja infralitoral, excavando en sustratos arenosos o fangosos. Puede vivir en estuarios al soportar reducciones de salinidad del 5%...

Desde Noruega y el Báltico hasta la costa oeste de África, incluido el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cerastoderma-edule.html>

## *Acanthocardia echinata* (Linnaeus, 1758)

Concha de hasta 7 cm de longitud, asimétrica, con el lado anterior redondeado y el posterior aplanado. Superficie con 18 - 23 costillas, con espinas m...

En fondos de sedimentos, desde los 10 m de profundidad....

Desde Noruega hasta la costa norte de África y el Mediterráneo...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/acanthocardia-echinata.html>

## *Acanthocardia aculeata* (Linnaeus, 1758)

Berberecho grande, de hasta 10 cm de longitud, asimétrica, con el lado anterior redondeado y el posterior aplanado, ligeramente abierta; borde dentado...

Enterrado en fondos arenosos, desde los 10 metros de profundidad....

Desde Noruega hasta la costa norte de África y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/acanthocardia-aculeata.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Bowerbankia imbricata* (Bryozoa)

*Delphinus delphis* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Oblada melanura* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Salpa democratica* (Forsk., 1775) (Urochorda)



*Squalus acanthias* Linnaeus, 1758 (Chordata)

