



## Num. 163. Publicado el 21/01/2008

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Tripleurospermum maritimum subsp. inodorum*. Por César Fernández González



## Num. 163. Publicado el 21/01/2008

### Descripciones de especies

#### *Phagnalon saxatile* (L.) Cass.

Pequeño arbusto de hasta 60 cm, con tallos ascendentes o erectos, cubiertos de un pilosidad lanosa. Las hojas, de 2.5 - 3.5 cm, de lineares a linear  
-...

Crece en rellanos y fisuras de roquedos calizos, muros, en zonas soleadas y secas, de los 100 a los 1200 m de altitud. Forma parte de comunidades  
pert...

Típica de la Región Mediterránea y el SO de Europa, en la Península falta en la zona norte más húmeda....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phagnalon-saxatile.html>

#### *Pedicularis comosa subsp. comosa* L.

Planta perenne, hemiparásita, con tallos de 15 - 50 cm, erectos o ascendentes. Las hojas, de 100 - 200 x 15 - 30 mm, son 2 pinnatisectas, de forma  
ovad...

Crece en pastos, herbazales, bosques abiertos, desde los 1200 m a los 2300 m de altitud....

Aparece en el centro y este de Europa, pero se extiende al norte de la Península y el norte de Italia...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pedicularis-comosa-subsp-comosa.html>

#### *Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC.

Planta perenne, con una raíz axonomorfa leñosa, del a que surgen tallos de hasta 25 cm, postrados, ramificados, agrupados, con las ramas  
divaricadas.L...

Crece en zonas pedregosas sobre sustrados ácidos, desde los 1100 a los 3300 m de altitud....

Aparece en zonas de montaña de la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/paronychia-polygonifolia.html>

#### *Parietaria judaica* L.

Planta perenne, con tallos leñosos en la base, que alcanzan los 80 cm, y son procumbentes o ascendentes, muy pubescentes y ramificados. Las hojas  
son a...



Crece principalmente en muros, aunque no es escasa en zonas ruderales y viarias, sobre suelos nitrificados, desde el nivel del mar a los 1500 m de alt...

Aparece en el S y O de Europa; en la Península aparece en todas las provincias....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/parietaria-judaica.html>

## *Pallenis spinosa* (L.) Cass.

Planta con tallos de hasta 60 cm, algo pelosos, duros, de base leñosa, con ramas que alcanzan la altura del tallo principal. Las hojas, alternas, son ...

Forma parte de pastos, de matorrales despejados, cunetas, en zonas de suelo seco, soleadas, desde los 50 a los 1500 m de altitud. Aparece en las sigui...

Planta mediterránea, que en la Península no aparece sólo en el extremo noroccidental....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pallenis-spinosa.html>

## *Lactarius volemus* (Fr.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 10 - 16 cm, carnoso, convexo al principio, luego deprimido, con la s...

Crece durante los meses del verano, en castaños, robledales y hayedos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-volemus.html>

## *Lactarius vietus* (Fr.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 4 - 8 cm, delgado, ondulado, con la superficie viscosa al principio,...

Prefiere los abedulares del piso montano, asentados en suelos muy húmedos, semiturbosos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-vietus.html>

## *Lactarius sphagneti* (Fr.) Neuhoff

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 5 - 6 cm de diámetro, de color pardo anaranjado, con el margen más ...

Es una especie estrictamente asociada con los suelos higroturbosos, en los que parece que mantiene estrecha relación con los musgos del género



Sphagnum...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-sphagneti.html>

## *Cardamine raphanifolia* subsp. *raphanifolia* Pourr

Planta perenne, con rizomas largos y horizontales de los que surgen tallos de 30 - 80 cm, robustos y glabros, erectos o ascendentes. Las hojas, glabras...

Crece junto a fuentes, orillas de arroyos, zonas turbosas, claros forestales, prados, acequias, en zonas frescas y húmedas sobre sustratos ácidos....

Aparece en las zonas montañosas del S de Europa, y en la Península en la zona más norteña....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-raphanifolia-subsp-raphanifolia.html>

## *Cardamine hirsuta* L.

Planta anual, con tallos glabros o poco pubescentes, de 3 - 30 cm. Las hojas inferiores, de 3 - 8 cm, aparecen en una roseta basal, son pinnadas, y ti...

Crece en pastos anuales, rellenos, márgenes de campos de cultivos, cunetas, orillas de caminos, en zonas generalmente nitrificadas y ruderales, fresca...

Especie subcosmopolita, aparece en toda Europa y la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-hirsuta.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Cardamine hirsuta* L. (Magnoliophyta)

*Dacrymyces tortus* (Willd.) Fr. (Basidiomycota)

*Lactarius sphagneti* (Fr.) Neuhoff (Basidiomycota)

*Lactarius vietus* (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

*Lactarius volemus* (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

*Lamprospora carbonicola* Boud. (Ascomycota)



*Pallenis spinosa* (L.) Cass. (Magnoliophyta)

*Parietaria judaica* L. (Magnoliophyta)

*Pedicularis comosa* L. (Magnoliophyta)

*Pedicularis comosa subsp. comosa* L. (Magnoliophyta)

*Phagnalon saxatile* (L.) Cass. (Magnoliophyta)

*Potentilla erecta* (L.) Raeusch. (Magnoliophyta)

*Prunus lusitanica* L. (Magnoliophyta)

*Resinicium furfuraceum* (Bres.) Parmasto (Basidiomycota)

*Tricholomopsis ornata* (Fr.) Singer (Basidiomycota)

*Vibrissea truncorum* (Alb. & Schwein.) Fr. (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008