



Num. 165. Publicado el 04/02/2008

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Echium vulgare*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 165. Publicado el 04/02/2008

Descripciones de especies

Puccinia sorghi Schwein.

Hongo de tipo roya, con un ciclo vital complejo, formado por 5 fases que se desarrollan todas en el mismo huésped. Estas fases son las siguientes: Los ...

Los picnidios y los ecios se desarrollan, en América, sobre diferentes especies del género *Oxalis*. Los uredos y los telios crecen sobre las hojas del ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-sorghi.html>

Polygonatum verticillatum (L.) All.

Planta perenne, rizomatosa, con tallos simples, algo arqueados, angulosos, de 20 - 80 cm, glabros o raramente algo pubérulos. Las hojas medias y super...

Crece en megaforbios, claros de bosques, matorrales, en zonas fértiles preferentemente calizas, desde los 1300 a los 2200 m de altitud. Es una planta...

Aparece en la mayor parte de Europa, si bien en la zona sur es más escasa. En la Península está presente en las montañas del norte, de Galicia a Catal...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polygonatum-verticillatum.html>

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

Planta perenne, con un rizoma que presenta engrosamientos visibles, con tallos simples, glabros, angulosos, de 15 - 65 cm, arqueados. Las hojas, de 30...

Crece en los bosques húmedos que se desarrollan en suelos humíferos de fondos de valles, matorrales, en zonas algo pedregosas, desde los 400 a los 180...

Presente en Europa si bien en el sur es más rara; en la Península aparece en la mitad norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polygonatum-odoratum.html>

Polygonatum multiflorum (L.) All.

Planta perenne, rizomatosa, con tallos de 30 - 80 cm, cilíndricos, simples, algo arqueados y glabros. Las hojas, alternas y dispuestas en dos hileras,...



Crece en bosques y matorrales sobre sustrato calcáreo, en zonas frescas, desde el nivel del mar a los 1800 m de altitud.. Es característica de comuni...

Presente en toda Europa, no aparece en el sudoeste, el este y alguna isla....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polygonatum-multiflorum.html>

Erica lusitanica Rudolphi

Arbusto de hasta 3 m de altura, con tallos provistos de un indumento de pelos lisos, patentes y blancos. Las hojas, de 2.1 - 7.5 x 0.4 - 0.5 mm, se re...

Crece en matorrales frescos y húmedos formados en suelos ácidos, desde el nivel del mar a los 800 m de altitud. Aparece en: Comunidades de la clase Cy...

Crece en matorrales frescos y húmedos formados en suelos ácidos, desde el nivel del mar a los 800 m de altitud. Aparece en: Comunidades de la clase Cy...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erica-lusitanica.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ascobolus carbonarius P. Karst. (Ascomycota)

Erica lusitanica Rudolphi (Magnoliophyta)

Lactuca virosa L. (Magnoliophyta)

Narcissus pseudonarcissus (Magnoliophyta)

Nectria sinopica (Fr.) Fr. (Ascomycota)

Polygonatum multiflorum (L.) All. (Magnoliophyta)

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (Magnoliophyta)

Polygonatum verticillatum (L.) All. (Magnoliophyta)

Puccinia sorghi Schwein. (Basidiomycota)



Stereum rameale (Schwein.) Burt (Basidiomycota)

Tubulicrinis subulatus (Bourdot & Galzin) Donk (Basidiomycota)

Volutella ciliata (Alb. & Schwein.) Fr. (Ascomycota)

