



Num. 17. Publicado el 04/04/2005

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Nigma walckenaeri*. Por César Fernández González



Num. 17. Publicado el 04/04/2005

Descripciones de especies

Venus striatula (da Costa, 1778)

Concha de hasta 4,5 cm de longitud, ligeramente triangular, con valvas similares. Presenta estrías de crecimiento irregulares, más juntas en la región...

Excava en la arena hasta los 60 m....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/venus-striatula.html>

Venerupis rhomboides (Pennant, 1777)

Concha de hasta 6 cm de longitud, oval, con valvas similares, estrías de crecimiento, pero sin estrías radiales marcadas. Carece de lúnula. Umbo dirig...

Enterrada en fondos de arena o grava hasta los 180 m....

De Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/venerupis-rhomboides.html>

Tellina incarnata (Linnaeus, 1758)

Concha aplastada, alargada, finamente estriada, de hasta 4,5 cm de longitud. Dos dientes cardinales en cada valva, y normalmente presenta dientes late...

Enterrada en arena y fango....

De las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tellina-incarnata.html>

Solen marginatus Pulteney, 1799

Concha de 12 - 12.5 cm de longitud, larga y estrecha, con valvas parecidas, con borde dorsal y ventral paralelos, estando los umbos y picos reducidos ...



Enterrado en fondos de arena y fango en la sección infralitoral....

De Noruega al O de África y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/solen-marginatus.html>

Sepia officinalis (Linnaeus, 1758)

Cefalópodo de cuerpo ancho, oval, casi rectangular, aplanado, de 30 - 40 cm, con aletas que recorren todo el cuerpo. El borde del manto dorsal forma u...

Sublitoral, hasta los 250 m, en arena o sedimentos, donde se pueden enterrar parcialmente. Se alimenta de crustáceos y peces. Realiza la puesta sobre ...

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo y Marruecos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sepia-officinalis.html>

Octopus vulgaris Cuvier, 1797

Aunque puede llegar a 1 m de longitud, generalmente no pasa de 60 - 80 cm. Cuerpo saciforme, redondeado, sin aletas, con el manto verrugoso. Tentáculo...

Costas rocosas, hasta 200 m de profundidad, entre rocas y piedras, a veces en guaridas. Se alimenta de pequeños crustáceos, como cangrejos. De natural...

Cosmopolita en mares templados y tropicales....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/octopus-vulgaris.html>

Loligo vulgaris (Lamarck, 1798)

Calamar de hasta 55 cm de longitud, con cuerpo ahusado y extremo romo y dos aletas laterales con forma de rombo, que recorren desde el extremo del cue...

Pelágico, vive entre 10 y 500 m de profundidad. Se alimenta de peces, crustáceos e incluso otros cefalópodos, realizando migraciones verticales con es...

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/loligo-vulgaris.html>



Ensis siliqua (Linnaeus, 1758)

Concha larga, que puede llegar a 20 cm de longitud. Bordes dorsal y ventral rectos y paralelos, con pico y umbo anterior, sin surco. Ligamento oscuro ...

Enterrado en fondos arenosos y de fango hasta 30 m de profundidad....

Desde Noruega al O de África incluido el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ensis-siliqua.html>

Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798)

Pulpo de hasta 50 cm de longitud, de color pardo, rojizo dorsalmente con motas blancas y blanquecino ventralmente, de cuerpo saciforme y verrugoso, co...

Sublitoral, entre rocas y piedras entre 5 y 700 m de profundidad. Se alimenta de crustáceos principalmente. Pueden vivir hasta 2 años, y luego mueren....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eledone-cirrhosa.html>

Donax vittatus (da Costa, 1778)

Concha equivalva, de hasta 38 mm de longitud, aplanada, y la mitad de ancha, con los umbos situados hacia atrás. Valva lisa, con las estrías de crecim...

Excava en arena, grava hasta los 20 metros. Común en costas arenosas algo expuestas y bahías....

Desde Noruega a Marruecos y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/donax-vittatus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Octopus macropus Risso, 1826 (Mollusca)

Oikopleura dioica Fol, 1872 (Urochorda)



Penaeus kerathurus (Forskäl, 1775) (Arthropoda)

Plesiopenaeus edwardsianus (Johnson, 1868) (Arthropoda)

Trachinotus ovatus Linnaeus, 1758 (Chordata)

