



## Num. 18. Publicado el 11/04/2005

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Macrosyringion longiflorum*. Por César Fernández González



## Num. 18. Publicado el 11/04/2005

### Descripciones de especies

#### *Scyllarus arctus* (Linnaeus, 1758)

Cangrejo fácil de identificar, de hasta 12 cm de longitud. Caparazón convexo, rectangular, pardo con líneas rojas ramificadas, con 3 dientes en la lín...

En rocas fangosas y fondos pedregosos desde 3 m. Hembras ovígeras entre febrero y abril y julio y septiembre....

Desde el sur de las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scyllarus-arctus.html>

#### *Palinurus elephas* (Fabricius, 1787)

La langosta es un crustáceo decápodo de de 30 - 50 cm de longitud, con el caparazón rojo pardo, con manchas amarillas en las patas, que tienen espinas...

En aguas poco profundas, hasta 70 m, en sustratos rocosos, donde se esconde entre las rocas y en grietas. Más raramente en sustratos pedregosos. Hembr...

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/palinurus-elephas.html>

#### *Palaemon elegans* Rathke, 1837

De 5 o 6 cm de longitud, con cefalotórax y abdomen recorridos por bandas pardas o pardo amarillentas. El rostro es recto o ligeramente curvado hacia a...

Típicamente en charcas intermareales, siendo más rara en el sublitoral. Hembras ovígeras en abril y mayo....

Desde Noruega al Mediterráneo, también en el Mar Negro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/palaemon-elegans.html>

#### *Nephrops norvegicus* (Linnaeus, 1758)

Longitud de 15 - 24 cm, largo y delgado, de color naranja pálido, con el caparazón con costillas y espinas, y al final del abdomen urópodos pares y te...



En sustratos blandos, desde 20 m en madrigueras que excava. Hábitos nocturnos. Hembras ovígeras de julio a febrero....

De Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nephrops-norvegicus.html>

## *Necora puber* (Linnaeus, 1767)

Caparazón plano, de 5 - 8 cm de longitud y 6 -7 cm de ancho. En la parte anterior, entre los ojos, el caparazón tiene 8 - 10 dientes, siendo los dos c...

Entre piedras y rocas, grietas, desde el sublitoral hasta los 70 m. Hembras ovígeras de febrero a noviembre....

Desde Noruega al Mediterráneo de influencia atlántica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/necora-puber.html>

## *Maja squinado* (Herbst, 1788)

Decápodo con caparazón en forma de pera, de 18 - 20 cm de longitud, convexo, con espinas agudas y cerdas de tamaño variable; las espinas laterales no ...

Sobre varios sustratos, hasta los 50 m. Hembras ovígeras entre Abril y Agosto....

Toda la costa europea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/maja-squinado.html>

## *Homarus gammarus* (Linnaeus, 1758)

De longitud variable, siendo los ejemplares mayores de 45 o 50 cm, aunque se han encontrado individuos mayores. Antenas principales tan largas como el...

En fondos de arena y roca, en grietas o agujeros excavados, cuevas, en la zona sublitoral hasta los 60 m. Solitario y agresivo, de hábitos nocturnos.

...

Desde Noruega al Mediterráneo y Mar Negro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/homarus-gammarus.html>

## *Chthamalus stellatus* (Poli, 1791)

Pequeña bellota de mar, de 6 - 10 mm de diámetro basal, con forma cónica y contorno irregular. Abertura oval o circular; el tergo más largo que la



mit...

Zona supralitoral, en rocas, en zonas moderadamente expuestas....

Desde Irlanda al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chthamalus-stellatus.html>

## *Chthamalus montagui* Southward, 1976

Pequeña bellota de mar, de 6 - 10 mm de diámetro basal, con forma cónica y contorno irregular. Abertura en forma de cometa; las placas tergaes son me...

Zona supralitoral, en rocas, en zonas moderadamente expuestas....

Desde Irlanda al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chthamalus-montagui.html>

## *Carcinus maenas* (Linnaeus, 1758)

Caparazón trapezoidal, de 5.5 - 6 cm de longitud y 7 - 7.5 de ancho, ligeramente granular. Presenta 3 dientes prominentes entre los ojos y otros 5 pun...

Habita el intermareal y submareal hasta 200 m de profundidad, en casi todos los sustratos y ambientes, estuarios, zonas fangosas, arenosas, charco...

*Carcinus maenas* es originaria de Europa y el norte de África y ha sido introducido en la región de América del Norte, Australia, partes de América...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carcinus-maenas.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Arnoglossus laterna* (Walbaum, 1792) (Chordata)

*Bugula neritina* (Bryozoa)

*Callista chione* (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

*Janthina pallida* Thompson, 1840 (Mollusca)



*Upogebia pusilla* (Petagna, 1792) (Arthropoda)

