



## **Num. 188. Publicado el 14/07/2008**

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: . Por César Fernández González



**Num. 188. Publicado el 14/07/2008**

## Descripciones de especies

*Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758)

El zorro es un animal muy conocido y desde antiguo es el protagonista de muchas fábulas y creencias. Su larga y tupida cola, que mide el 70% de la lon...

El zorro habita todo tipo de ambientes, desde zonas subárticas a desérticas, en medios forestales, abiertos o incluso en las cercanías de ciudades. En...

El zorro es el cánivoro más abundante del mundo y se encuentra por gran parte de Europa, excepto el Círculo Polar. En la Península es abundante en tod...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vulpes-vulpes.html>

*Saxifraga longifolia* Lapeyr.

Planta perenne provista de un indumento de glándulas planas, sésiles y estipitadas, y pelos glandulíferos y no glandulíferos. Tienen una roseta basal ...

Crece en las grietas de rocas calizas o espolones calcáreos, desde los 1000 a los 2000 m de altitud. ...

Presente en la Península Ibérica y Marruecos, en la primera aparece en los Pirineos de forma abundante y en la Cordillera Cantábrica esporádicamente, ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-longifolia.html>

*Rupicapra pyrenaica* Bonaparte, 1845

El rebeco es un animal de pequeño tamaño, más pequeño y esbelto que la cabra montés (*Capra pirenaica*), pero fuerte. Sus patas son robustas, el cuerpo ...

El rebeco es una especie característica del piso subalpino, habitando el límite superior de los bosques y los pastos supraforestales; en verano ocupa ...

El rebeco se encuentra desde el Cáucaso a la Europa atlántica y aparece en la mayoría de las cadenas montañosas de Europa. En la Península Ibérica exi...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rupicapra-pyrenaica.html>



## *Rosellinia subsimilis* P. Karst. & Starbäck

Ascomycete (pyrenomycete) que forma estromas uniperiteciados, subglobulosos, gregarios, aislados o confluyendo en pequeños grupos. De color pardo o pa...

Sobre restos herbáceos y leñosos diversos....

Parece ser una especie muy común en las regiones alpinas de Europa y Norteamérica, sobre restos herbáceos y leñosos diversos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rosellinia-subsimilis.html>

## *Ranunculus omiophyllus* Ten.

Planta anual o vivaz, prostrada, acuática, cuyas hojas caulinares son todas laminares, opuestas o alternas, con el limbo de 2 - 26 x 3 - 32 mm, de form...

Este ranúnculo crece en terrenos cenagosos, fuentes o manantiales, en arroyos, acequias, charcas, generalmente en medios pobres en sales y ácidos.

...

Aparece en la Europa atlántica, desde el norte de Francia a Portugal. En la Península aparece en la mitad norte principalmente....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-omiophyllus.html>

## **Novedades corológicas**

### *Rosellinia subsimilis* P. Karst. & Starbäck (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 12/07/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//5045.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Arenaria erinacea* Boiss. (Magnoliophyta)

*Arenaria grandiflora subsp. incrassata* (Lange) C. Vicioso (Magnoliophyta)

*Carduus carpetanus* Boiss. & Reut. (Magnoliophyta)

*Coprinopsis urticicola* (Berk. & Broome) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)



*Coprinus phaeosporus* P. Karst. (Basidiomycota)

*Coreus marginatus* (Arthropoda)

*Cyperus eragrostis* Lam. (Magnoliophyta)

*Cytisus cantabricus* (Willk.) Rchb. F. (Magnoliophyta)

*Geum x intermedium* (Magnoliophyta)

*Gypsophila repens* L. (Magnoliophyta)

*Gyromitra leucoxantha* (Bres.) Harmaja (Ascomycota)

*Lampyris iberica* (Arthropoda)

*Malacosoma castrensis* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Nepeta cantabrica* Ueberl. & Valdés (Magnoliophyta)

*Octaviania aterosperma* Vittad. (Basidiomycota)

*Rosellinia subsimilis* P. Karst. & Starbäck (Ascomycota)

*Saxifraga canaliculata* Boiss. & Reut. (Magnoliophyta)

*Scutellaria alpina* L. (Magnoliophyta)

*Scutellaria alpina subsp. alpina* L. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008