



## Num. 189. Publicado el 21/07/2008

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Oxalis purpurea*. Por José Luis Porto Torres



**Num. 189. Publicado el 21/07/2008**

## Descripciones de especies

*Neonectria hederæ* (C. Booth) Castl. & Rossman

Hongo ascomycete que forma ascomas gregarios, reunidos en racimos de muchos ejemplares, uniperiteciados y de hasta 350 micras de longitud, piriformes u...

Específico de la madera de la hiedra (*Hedera helix*) y mucho menos común que *Nectria* sinópica....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/neonectria-hederæ.html>

*Microtus arvalis* (Pallas, 1778)

Se trata de un pequeño ratoncillo, topillo, arvicolino de cuerpo macizo y redondeado, con la cola y las orejas cortas. Tienen el dorso de color pardo ...

El topillo campesino vive durante épocas de baja densidad poblacional en zonas abiertas con cobertura herbácea o arbustiva en la que la vegetación se ...

Aparece en toda Europa, de forma continua desde la costa atlántica francesa al centro de Rusia, además de la población aislada ibérica. Falta en las I...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/microtus-arvalis.html>

*Felis sylvestris* (Schreber, 1777)

El gato montés es un mamífero carnívoro de cuerpo robusto, largo, y con las extremidades cortas. La cola es corta y gruesa, y es más espesa en el fina...

A pesar de que el gato montés puede vivir en sotos fluviales o zonas incluso más o menos esteparias, necesita obligatoriamente masas arbóreas cercanas...

En Europa aparece desde el occidente al Cáucaso, con poblaciones relictas en la Península Ibérica, Itálica y Balcánica, en Escocia, el centro de Europ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/felis-sylvestris.html>

*Chaenorhinum organifolium* (L.) Kostel.



Planta perenne con tallos de hasta 35 cm, numerosos, de ascendentes a erectos, simples o ramificados, con pelos glandulosos patentes al menos en la pa...

Crece en fisuras de roquedos, pedrizas, pastos pedregosos, desde los 500 a los 2500 m de altitud. Es característica de comunidades del orden Potentill...

Aparece en el norte de África y el SO de la Península, dónde principalmente habita en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chaenorhinum-origanifolium.html>

## *Brunnipila calycioides* (Rehm) Baral

Hongo que forma ascomas diminutos (hasta 0,5 mm de altura), cupuliformes, estipitados, hirtos. Los ascos, desprovistos de uncínulos y de hasta 56 x 7,...

Especie que vive sobre los tallos muertos de diversas gramíneas...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/brunnipila-calycioides.html>

## **Novedades corológicas**

### *Brunnipila calycioides* (Rehm) Baral (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 14/07/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/brunnipila-calycioides-rehm-baral-1/5060.html>

### *Coccomyces leptideus* (Fr.) B. Erikss. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 19/07/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coccomyces-leptideus-fr-b-erikss-1/5094.html>

### *Puccinia calcitrapae* DC. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 16/07/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/puccinia-calcitrapae-dc/5074.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Brunnipila calycioides* (Rehm) Baral (Ascomycota)



*Calopteryx virgo subsp. meridionalis* (Arthropoda)

*Coccomyces leptideus* (Fr.) B. Erikss. (Ascomycota)

*Coeloglossum viride* (L.) Hartm. (Magnoliophyta)

*Euphorbia pyrenaica* Jord. (Magnoliophyta)

*Felis sylvestris* (Schreber, 1777) (Chordata)

*Filipendula vulgaris* Moench (Magnoliophyta)

*Linum alpinum* Jacq. (Magnoliophyta)

*Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Microtus arvalis* (Pallas, 1778) (Chordata)

*Omphalina gerardiana* (Peck) Singer (Basidiomycota)

*Puccinia calcitrapae* DC. (Basidiomycota)

*Saxifraga babiana* T.E. Díaz & Fern. Prieto (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887506008