



Num. 191. Publicado el 04/08/2008

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Cygnus atratus*. Por César Fernández González



Num. 191. Publicado el 04/08/2008

Descripciones de especies

Pedicularis pyrenaica subsp. pyrenaica J. Gay

Planta perenne con tallos de 10 - 20 cm, arqueados - ascendentes, no ramificados, subcilíndricos, de sección cuadrangular y pelosos en dos caras.
Las ...

Crece en los pastizales algo húmedos en zonas de montaña sobre suelos ácidos, desde 1300 a 2300 m de altitud. Forma parte de las siguientes comunidad...

Es una subespecie endémica de los Pirineos y la Cordillera Cantábrica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pedicularis-pyrenaica-subsp-pyrenaica.html>

Lycopodium clavatum L.

Planta con tallos de hasta 80 cm, herbáceos, prostrado - radicales, con ramas de unos 20 cm, ascendentes y dicótomas, de simetría radiada. Los micrófi...

Crece en brezales, en matorrales o bosques montanos y subalpinos acidófilos, desde los 700 a los 2000 m de altitud. Aparece en numerosas comunidades v...

Aparece en el sistema pirenaico - cantábrico, el Sistema Ibérico y la Serra da Estrela portuguesa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lycopodium-clavatum.html>

Drosera longifolia L.

Planta perenne, carnívora, con hojas ascendentes o erectas, de 15 - 40 x 2 - 5 mm, de forma oblongo - lanceolada, con la base cuneada y un peciolo de ...

Esta drosera crece en prados inundados y zonas turbosas en áreas de montaña y con esfagnos, desde los 1100 m a los 1900 m de altitud....

Norte y centro de Europa, norte de Asia, Japón y norte de América. Pirineos centrales y zona occidental de la Cordillera Cantábrica, con una localidad...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/drosera-longifolia.html>

Centaurea lagascana Graells



Planta bianual, acule, con las hojas formando una roseta basal; son cortamente pecioladas, lanosas, glabrescentes en el haz, pinnatisectas, con segmen...

Crece en crestones calizos sobre suelos removidos o recientemente incendiados. Es característica de comunidades pertenecientes a la alianza Cynosurion...

Especie endémica del norte de la Península Ibérica, con el límite oriental en el País Vasco....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-lagascana.html>

Aegilops geniculata Roth.

Planta anual con numerosos tallos de hasta 30 cm, con hojas pelosas o glabras, normalmente planas, con vainas glabras y algo infladas. Las flores se r...

Crece en pastos, cunetas y barbechos y zonas caldeadas y ruderalizadas, desde los 250 a los 1200 m de altitud. Es característica de comunidades perten...

Aparece en la región Macaronésica y la cuenca Mediterránea; en la Península en la zona seca y Portugal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aegilops-geniculata.html>

Novedades corológicas

Ombrophila rivulorum Velen. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 29/07/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ombrophila-rivulorum-velen-1/5167.html>

Pezizella eriophori Dennis (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 29/07/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pezizella-eriophori-dennis-1/5156.html>

Pyrenopeziza chailletii (Pers.) Fuckel (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 29/07/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pyrenopeziza-chailletii-pers-fuckel-1/5159.html>

Tritonia lineata (Alder & Hancock, 1848) (Mollusca)

- Citado por Marcos Fernández Iglesias el día 30/07/2008



Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/tritonia-lineata/5170.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aegilops geniculata Roth. (Magnoliophyta)

Centaurea janeri subsp. babiana (Magnoliophyta)

Centaurea lagascana Graells (Magnoliophyta)

Centaurea lagascana subsp. lagascana (Magnoliophyta)

Columba palumbus Linnaeus, 1758 (Chordata)

Drosera anglica Huds. (Magnoliophyta)

Drosera longifolia L. (Magnoliophyta)

Hypoxylon howeanum (Ascomycota)

Limonium dodartii (Magnoliophyta)

Ombrophila rivulorum Velen. (Ascomycota)

Pezizella eriophori Dennis (Ascomycota)

Plantago media L. (Magnoliophyta)

Pyrenopeziza chailletii (Pers.) Fuckel (Ascomycota)

Pyronema domesticum (Sowerby) Sacc. (Ascomycota)

Tanacetum vulgare (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068

