



## Num. 192. Publicado el 25/08/2008

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Lysimachia vulgaris*. Por José Luis Porto Torres



**Num. 192. Publicado el 25/08/2008**

## Descripciones de especies

### *Swertia perennis* L.

Planta herbácea perenne, glabra, con un rizoma oblicuo del que surge un tallo erecto que mide entre 15 y 30 cm, con el tallo de verde violáceo a pardo...

Crece en lagunas y prados turbosos, encharcados, en zonas de alta montaña, desde los 1500 a 2000 m de altitud, en aguas ricas o medias....

Aparece desde el centro de Europa a Pirineos y la Cordillera Cantábrica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/swertia-perennis.html>

### *Quercus pyrenaica* Willd.

Árbol de hasta 25 m de altura, en zonas adversas reducido a un arbusto estolonífero, con el tronco recto y esbelto, a veces tortuoso, liso al principi...

Crece formando bosques extensos especialmente en suelos silíceos (cuarcitas, areniscas, pizarras, micacitas, neises, granitos, arenas, conglomerados,.....

Aparece en el O y SO de la Península (mitad norte y sistemas montañosos del S) y Marruecos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/quercus-pyrenaica.html>

### *Mollisia ramealis* P. Karst.

Ascomycete que forma pequeñas (1-1,5 mm) fructificaciones gregarias, sésiles, discoideas, poco o nada cupuliformes salvo en las primeras fases de su d...

Sobre madera, en lugares húmedos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mollisia-ramealis.html>

### *Genetta genetta* (Linnaeus, 1758)

La gineta es un mamífero carnívoro de tamaño medio, similar a un gato, de cuerpo alargado y esbelto, sustentado por unas cortas extremidades y una col...

Es considerado un animal forestal que vive en zonas rocosas en las cercanías de arroyos, pero la elección del hábitat viene determinada por la presenc...



Aparece en África, Arabia y el SO de Europa, donde se cree que ha sido introducida en los últimos 2000 años de África. En la Península aparece princip...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/genetta-genetta.html>

*Anarrhinum duriminium* (Brot.) Pers.

Planta herbácea bienal o perenne, pubescente - glandular, con tallos de hasta 90 cm, ramosos, muy foliosos. Las hojas son heteromorfas, con la base ate...

Crece en pedregales, roquedos y taludes formados en suelos de granitos o cuarcitas desde los 100 a los 700 m de altitud....

Especie endémica del NO de la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anarrhinum-duriminium.html>

## **Novedades corológicas**

*Mollisia ramealis* P. Karst. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 19/08/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/mollisia-ramealis-p-karst-1/5336.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Aix sponsa* (Chordata)

*Atlantoxerus getulus* (Chordata)

*Erysimum linifolium* (Magnoliophyta)

*Genetta genetta* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Mollisia ramealis* P. Karst. (Ascomycota)

*Odontites viscosus subsp. australis* (Boiss.) Jahand. & Maire (Magnoliophyta)

*Odontites viscosus subsp. hispanicus* (Boiss. & Reut.) Rothm. (Magnoliophyta)



*Quercus pyrenaica* Willd. (Magnoliophyta)

*Ranunculus peltatus* Schrank (Magnoliophyta)

*Reseda luteola* L. (Magnoliophyta)

*Tettigonia viridissima* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Typhula uncialis* (Grev.) Berthier (Basidiomycota)

*Viburnum opulus* L. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008