



## Num. 194. Publicado el 08/09/2008

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Ocinebrina edwardsii*. Por César Fernández González



**Num. 194. Publicado el 08/09/2008**

## Descripciones de especies

### *Sagina merinoi* Pau

Hierbas anuales o perennes, más o menos cespitosas, con tallos procumbentes o ascendentes, más raramente erectos. Hojas opuestas, lineares, agudas, más...

Este endemismo crece en rellanos rocosos, claros de brezales, campos abandonadas, en suelos ultrabásicos de serpentinas, desde el nivel del mar a los ...

Suelos serpentínicos de Galicia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sagina-merinoi.html>

### *Neomys fodiens* (Pennant, 1771)

Este sorícido es el mayor de los presentes en la Península, con un tamaño de 68 - 97 mm y un peso de 10 - 23 gr. Debido a sus hábitos acuáticos, la pa...

Vive exclusivamente ligado a ambientes de cursos de agua permanentes, limpios y bien oxigenados, ricos en alimento, si bien ocasionalmente coloniza zo...

Aparece desde el norte de la Península al Lago Baikal. En la Península desde el Pirineo al norte de A Coruña, con el límite meridional en Burgos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/neomys-fodiens.html>

### *Lepus europaeus* Pallas, 1778

Liebre de color pardo amarillento, con manchas negras, excepto la zona ventral que es blanquecina y de poca extensión; el extremo de las orejas es neg...

La liebre vive en zonas variadas, pero prefiere las abiertas en Europa, grandes estepas de cereales; en el norte de la Península vive en las campiñas co...

La liebre aparece en la mayor parte de Europa y el SO de Asia, excepto Escandinavia, el norte de Rusia, las Islas Británicas y la mayor parte de la Pe...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lepus-europaeus.html>



## *Eliomys quercinus* (Linnaeus, 1766)

El lirón es un pequeño mamífero con el dorso pardo - rojizo y el vientre blanco; es muy llamativa una mancha negruzca que a modo de antifaz tiene en o...

El lirón careto vive en numerosos árboles terrestres y arbóreos, siendo frecuentes en zonas de árboles de frutos secos como el castaño, haya, avellano...

Aparece en casi toda Europa, desde el Báltico y el sur de Finlandia al sur de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eliomys-quercinus.html>

## *Chondria dasyphylla* (Woodward) C. Agardh

Alga con un talo formado por ejes cilíndricos erectos que surgen en densas matas desde un disco basal sólido de hasta 5.5 mm de diámetro; los talos mi...

Crece en rocas, más frecuentemente en sustratos móviles como conchas, siendo tolerante a zonas expuestas, desde charcas del intermareal a los 20 m de ...

Desde Suecia a la Península y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chondria-dasyphylla.html>

## **Novedades corológicas**

### *Coprotus leucopocillum* Kimbr., Luck-Allen & Cain (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 06/09/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coprotus-leucopocillum-kimbr-luck-allen-cain-1/5478.html>

### *Cyclaneusma minus* (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 02/09/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cyclaneusma-minus-butin-dicosmo-peredo-minter-1/5438.html>

### *Orbilbia carpoboloides* (P. Crouan & H. Crouan) Baral (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 06/09/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/orbilbia-carpoboloides-p-crouan-h-crouan-baral-1/5476.html>



## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Arum italicum* Mill. (Magnoliophyta)

*Chondria dasyphylla* (Rhodophyta)

*Coprotus leucopocillum* Kimbr., Luck-Allen & Cain (Ascomycota)

*Corvus corone* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Cyclaneusma minus* (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter (Ascomycota)

*Dianthus langeanus* Willk. (Magnoliophyta)

*Eliomys quercinus* (Linnaeus, 1766) (Chordata)

*Lepus europaeus* Pallas, 1778 (Chordata)

*Neomys fodiens* (Pennant, 1771) (Chordata)

*Ombrophila pura* (Pers.) Baral (Ascomycota)

*Orbilia carpoboloides* (P. Crouan & H. Crouan) Baral (Ascomycota)

*Phaeomarasmium erinaceus* (Pers.) Scherff. ex Romagn. (Basidiomycota)

*Plantago holosteum* Scop. (Magnoliophyta)

*Plantago maritima* subsp. *serpentina* (All.) Arcang. (Magnoliophyta)

*Puccinia convolvuli* (Pers.) Castagne (Basidiomycota)

