



## Num. 196. Publicado el 22/09/2008

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Terfezia arenaria*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 196. Publicado el 22/09/2008**

## Descripciones de especies

### *Pucciniastrum agrimoniae* (DC.) Tranzschel

Hongo de tipo roya cuyo ciclo vital atraviesa por 5 fases, de las cuales las dos primeras, los espermogonios y los eciosoros. Los uredinios o uredosor...

Aparece parasitando especies del género Agrimonia, como Agrimonia eupatoria, Agrimonia pilosa y Agrimonia repens. Las fases desconocidas del ciclo se ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pucciniastrum-agrimoniae.html>

### *Lycoperdon perlatum* Pers.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o basidiomicetes claviformes, muy capitados, con una cabezuela globosa, de color blanco en un principio pero ...

Aparece en todo tipo de bosques durante el otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lycoperdon-perlatum.html>

### *Hebeloma crustuliniforme* (Bull.) Quéf.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero muy viscoso, de 3 - 10 cm de diámetro, convexo, pronto abierto, de colo...

Es un hongo muy versátil, que puede vivir desde los pinares costeros a las praderas subalpinas con *Dryas octopetala*....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hebeloma-crustuliniforme.html>

### *Cortinarius orellanus* Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas, con un sombrero de 7 - 10 cm, convexo, más o menos abierto, muy seco, finamente escamoso...

Esta especie es poco frecuente y vive en los bosques de planifolios con suelo arenoso, fundamentalmente en aquellos de robles y castaños....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-orellanus.html>



*Carex cuprina* (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern.

Planta perenne cespitosa con un rizoma robusto con vainas fibrosas, afilas y pardas claras. Los tallos, trígonos, de hasta 100 cm, tienen tallos algo ...

Crece en los prados y herbazales húmedos o encharcados, en zonas nitrificadas, desde el nivel del mar a los 1200 m de altitud. Es característica de co...

Aparece en casi toda Europa y en la Península está ampliamente distribuido....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-cuprina.html>

## **Novedades corológicas**

*Dermea ariae* (Pers.) Tul. & C. Tul. ex P. Karst. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 15/09/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/dermea-ariae-pers-tul-c-tul-ex-p-karst-1/5529.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Agrocybe vervacti* (Fr.) Singer (Basidiomycota)

*Aster linosyris* (L.) Bernh. (Magnoliophyta)

*Calidris pusilla* (Chordata)

*Calycina phyllophila* (Desm.) Baral (Ascomycota)

*Clitocybe odora* (Bull.) P. Kumm. (Basidiomycota)

*Cortinarius orellanus* Fr. (Basidiomycota)

*Dermea ariae* (Pers.) Tul. & C. Tul. ex P. Karst. (Ascomycota)

*Ephippiger ephippiger* (Arthropoda)

*Hebeloma crustuliniforme* (Bull.) Quéf. (Basidiomycota)

*Lycoperdon molle* Pers. (Basidiomycota)



*Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Volvariella caesiotincta* P. D. Orton (Basidiomycota)

