



## Num. 197. Publicado el 29/09/2008

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lasiochaeria hirsuta*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 197. Publicado el 29/09/2008**

## Descripciones de especies

*Tubifera ferruginosa* (Batsch) J.F. Gmel.

Se trata de un hongo mucilaginoso que forma plasmodios (una masa ameboide con desplazamiento propio). La germinación de las esporas conduce a la forma...

Un hongo frecuente que se desarrolla sobre madera caída de árboles....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tubifera-ferruginosa.html>

*Puccinia convolvuli* (Pers.) Castagne

Hongo de tipo roya cuyo ciclo vital atraviesa por las siguientes 5 fases: Los espermogonios son escasos, subepidérmicos, de color amarillento, con parí...

Crece en las hojas y peciolo de *Calystegia sepium*, y algunas otras especies del género....

Aparece en casi toda Europa. En la Península ampliamente distribuida....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-convolvuli.html>

*Pezizella eriophori* Dennis

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o ascomas, diminutos (hasta 750 µm de diámetro), gregarios y ,en ocasiones, confluyentes, poseen una mo...

Rara especie que vive y fructifica sobre las hojas basales, envolventes y ya muertas, de *Eriophorum angustifolium* en las turberas de montaña....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pezizella-eriophori.html>

*Aster linosyris* (L.) Bernh.

Hierba perenne, con un corto rizoma más o menos horizontal, de 14-63 x 2-5 mm, del que nace un fascículo de raíces más o menos engrosadas. Tallos de 1...

Roquedos, pastizales, claros de brezal y otros matorrales, de carrascal o quejigar, generalmente en calizas; 0-1300(1900) m....

Roquedos, pastizales, claros de brezal y otros matorrales, de carrascal o quejigar, generalmente en calizas; 0-1300(1900) m....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aster-linosyris.html>

## *Andryala integrifolia* L.

Planta de annual o perenne, con tallos de hasta 80 cm, normalmente solitarios, simples o muy ramificados, con pelosidad más o menos densa estrellada y...

Crece en pastos pedregosos, cunetas, calveros arenosos y otros suelos secos ligeros, desde el nivel del mar a los 1300 m de altitud. ...

Aparece en la Región Mediterránea y el SO de Europa, hasta el O de Francia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/andryala-integrifolia.html>

## **Novedades corológicas**

### *Galerina cephalotricha* Kühner (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 22/09/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//5585.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Galerina cephalotricha* Kühner (Basidiomycota)

### *Gyps fulvus* (Hablizl, 1783) (Chordata)

### *Lasiobolus macrotrichus* Rea (Ascomycota)

### *Naohidemycetes vacciniorum* (Link) Spooner (Basidiomycota)

### *Tubaria furfuracea* (Pers.) Gillet (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068

