



Num. 197. Publicado el 29/09/2008

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lasiochaeria hirsuta*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 197. Publicado el 29/09/2008

Descripciones de especies

Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel.

Se trata de un hongo mucilaginoso que forma plasmodios (una masa ameboide con desplazamiento propio). La germinación de las esporas conduce a la forma...

Un hongo frecuente que se desarrolla sobre madera caída de árboles....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tubifera-ferruginosa.html>

Puccinia convolvuli (Pers.) Castagne

Hongo de tipo roya cuyo ciclo vital atraviesa por las siguientes 5 fases: Los espermogonios son escasos, subepidérmicos, de color amarillento, con parí...

Crece en las hojas y peciolo de *Calystegia sepium*, y algunas otras especies del género....

Aparece en casi toda Europa. En la Península ampliamente distribuida....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-convolvuli.html>

Pezizella eriophori Dennis

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o ascomas, diminutos (hasta 750 μ s de diámetro), gregarios y ,en ocasiones, confluyentes, poseen una mo...

Rara especie que vive y fructifica sobre las hojas basales, envolventes y ya muertas, de *Eriophorum angustifolium* en las turberas de montaña....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pezizella-eriophori.html>

Aster linosyris (L.) Bernh.

Planta perenne, con tallos de 10 - 70 cm, de decumbentes a erectos, débilmente escábridos y muy hojosos, algo pelosos. Las hojas, estrechas, sésiles, ...

Crece en zonas rocosas y pastos pedregosos abiertos, desde el nivel del mar a los 1000 m de altitud. Es característico de comunidades de la Clase Fest...

Presente en el sur y centro de Europa, se extiende localmente al norte a las Islas Británicas, el SE de Suecia y el centro de Rusia....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aster-linosyris.html>

Andryala integrifolia L.

Planta de annual o perenne, con tallos de hasta 80 cm, normalmente solitarios, simples o muy ramificados, con pelosidad más o menos densa estrellada y...

Crece en pastos pedregosos, cunetas, calveros arenosos y otros suelos secos ligeros, desde el nivel del mar a los 1300 m de altitud. ...

Aparece en la Región Mediterránea y el SO de Europa, hasta el O de Francia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/andryala-integrifolia.html>

Novedades corológicas

Galerina cephalotricha Kühner (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 22/09/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//5585.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calidris minuta Leisler, 1812 (Chordata)

Galerina cephalotricha Kühner (Basidiomycota)

Gyps fulvus (Hablizl, 1783) (Chordata)

Lasiobolus macrotrichus Rea (Ascomycota)

Naohidemyces vacciniorum (Link) Spooner (Basidiomycota)

Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet (Basidiomycota)

