



Num. 2. Publicado el 20/12/2004

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Anagallis tenella*. Por José Luis Porto Torres



Num. 2. Publicado el 20/12/2004

Descripciones de especies

Taonia atomaria (Woodward) Agardh

Fronde de 7 a 30 cm de longitud, de textura papirácea, ápice truncado y margen irregular. Se encuentra fijada al sustrato por un disco basal y se va e...

Infralitoral, en piedras, rocas o conchas hasta los 20 m, en lugares moderadamente expuestos....

Desde las Islas Británicas a Senegal y el Mediterráneo. Pakistán....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/taonia-atomaria.html>

Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link

Alga formada por unos tubos huecos estrechos, de grosor constante no superior a 1 cm de diámetro y 40 cm de largo que surgen de un disco basal y acaba...

En rocas, piedras, conchas o epífita, en el intermareal y sublitoral....

Desde Noruega al Mediterráneo. Namibia, Sudáfrica, NE y NO de América, Japón, China, Perú, Chile, Australia y Nueva Zelanda....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scytosiphon-lomentaria.html>

Padina pavonica (L.) Thivy

Fronde de unos 10 cm, en forma de abanico, cóncavo, siendo la parte externa con un bandeado pardo verdoso y la interna verde amarillento....

Mediolitoral, sobre piedras y rocas en costas poco batidas e iluminadas....

Desde las Islas Británicas a Angola y el Mediterráneo. E de África y SE asiático....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/padina-pavonica.html>

Leathesia difformis (L.) Areschoug

Alga de unos 5 cm de diámetro, unida al sustrato por un corto estipe, en forma de bola con paredes gruesas cuando es pequeña, pero que con la edad se ...

En el intermareal y submareal, en rocas o sobre Corallina....



Desde Noruega al Mediterráneo, Mauritania, Sudáfrica, Japón, China, NE y NO de América, Australia y Nueva Zelanda....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leathesia-diformis.html>

Halidrys siliquosa (L.) Lyngbye

Fronde algo comprimida, de textura coriácea, de unos 2 metros, que se origina de un disco de fijación cónico y fuerte. Fronde ramificada alternamente e...

Intermareal y primeros metros del sublitoral, fijada a rocas, en zonas arenosas hasta 20 m de profundidad....

Desde Noruega al Cantábrico. También en las Azores....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/halidrys-siliquosa.html>

Fucus vesiculosus L.

Fronde de 15 a 120 cm de longitud y 25 mm de anchura, acintado, de ramificación dicótoma, con un nervio central y margen entero, fijada por un disco c...

Forma una banda característica en el intermareal, sobre rocas....

Desde Noruega a las Canarias, entrando en el Mediterráneo hasta Málaga. Costa NE de América....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fucus-vesiculosus.html>

Fucus spiralis L.

Fronde pardo verdosa de 15 - 40 cm de longitud y de hasta 25 mm de anchura, aplanada y correosa, con nervio central y borde entero, ligeramente ondula...

En zona supralitoral, bajo la franja de Pelvetia....

Desde Noruega hasta la costa norte de África, Canarias y Azores; Mediterráneo más occidental. Costa NO y NE de América....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fucus-spiralis.html>

Fucus serratus L.

Alga parda, fijada al sustrato por un disco cónico, que puede alcanzar 60 cm de longitud. Ramificación dicótoma o más irregular. Fronde con nervio cen...



Forma una banda característica del litoral. En rocas, piedras....

Desde Noruega a Portugal; en el Cantábrico desde el occidente hasta la Concha de Artedo (Cudillero) de forma continua, pero existen poblaciones aisladas...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fucus-serratus.html>

Fucus ceranoides L.

La más pequeña de las especies de Fucus, entre 30 y 60 cm de longitud. Aspecto delicado, como papel mojado, negruzco, con nervio medio poco prominente...

Desde el supralitoral a infralitoral, sobre rocas y piedras, en medios de salinidad variable, como estuarios o desembocaduras de ríos....

Desde Noruega a las Azores, no presente en el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fucus-ceranoides.html>

Colpomenia peregrina (Sauvageau) Hamel

Fronde con aspecto de bola o saco, que llega a tener un diámetro entre 7 y 9 cm, aunque puede alcanzar los 20. Frondes jóvenes carnosos, pero se vuelven...

Epífita o sobre rocas, charcas de marea, hasta los 20 metros....

Desde Noruega a Liberia, Mediterráneo, costa noroeste de América, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Es una especie invasora, originaria de la costa pacífica...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/colpomenia-peregrina.html>

