



Num. 202. Publicado el 03/11/2008

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Pedicularis verticillata subsp. verticillata*. Por César Fernández González



Num. 202. Publicado el 03/11/2008

Descripciones de especies

Rosellinia corticium (Schwein.) Sacc.

Ascomycete que forma estromas subsféricos y uniperiteciados de hasta 1,3 mm, de color pardo violáceo o negruzco y consistencia carbonosa, que reposan...

Sobre madera...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rosellinia-corticium.html>

Pyrenopeziza karstenii Sacc.

Ascomas de hasta 0,3 mm de diámetro, gregarios, sésiles, globulosos, más tarde urceolados, que se desarrollan sobre un enjaretado de hifas grisáceas o...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pyrenopeziza-karstenii.html>

Phyllactinia guttata (Wallr.) Lév.

Hongo que desarrolla ascomas (cleistotecios) esféricos, superficiales, diminutos (0.25 mm), de color amarillento, anaranjado o pardo oscuros, según su...

Parasita las hojas de los avellanos (*Corylus avellana*) por lo general, pero también las de otros planifolios....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phyllactinia-guttata.html>

Coprobria granulata (Bull.) Boud.

Pequeño ascomycete que forma apotecios de 1 - 3 mm de diámetro, brevemente cupuliformes, sésiles, confluyendo a menudo varios formando grupos conspic...

Muy común sobre excrementos de bóvidos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coprobria-granulata.html>

Asplenium viride Huds.



Helecho con un rizoma postrado, radicante, que está cubierto de páleas de color pardo oscuro en toda su extensión. De ellos surgen frondes que alcanza...

Crece en grietas y entre rocas de gleras de calizas, desde los 800 a los 3300 m de altitud. Es característico de comunidades del orden Potentilletalia...

Aparece principalmente en la Región Mediterránea y Eurosiberiana. En la Península lo hace en los Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Si...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asplenium-viride.html>

Novedades corológicas

Lyophyllum subglobisporum Consiglio & Contu (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 31/10/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lyophyllum-subglobisporum-consiglio-contu-1/5853.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agaricus subperonatus (J. E. Lange) Singer (Basidiomycota)

Hygrocybe aurantiolutescens P. D. Orton (Basidiomycota)

Leotia lubrica (Scop.) Pers. (Ascomycota)

Leucoagaricus pilatianus (Demoulin) Bon & Boiffard (Basidiomycota)

Lyophyllum subglobisporum Consiglio & Contu (Basidiomycota)

Marasmius cohaerens (Pers.) Cooke & Quél. (Basidiomycota)

Mycena capillaripes Peck (Basidiomycota)

