



Num. 204. Publicado el 17/11/2008

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Trichaptum abietinum*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 204. Publicado el 17/11/2008

Descripciones de especies

Sedum anglicum Huds.

Planta perenne, glabra, grisácea, glauca o blanquecina. Raíz principal más o menos desarrollada, raíces secundarias abundantes. Tallos de hasta 12 cm,...

Pedreras, muros, rellanos, lugares arenosos, etc.; 0-2700 m....

Europa occidental, S de Francia y Península Ibérica. Pirineos, N y NW peninsular....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sedum-anglicum.html>

Saxifraga paniculata Mill.

Planta perenne y cespitosa, que forma rosetas de hojas basales de hasta 5 cm de diámetro, que permanecen unidas por estolones y que tienen glándulas p...

Crece en roquedos y zonas pedregosas desde los 1200 a los 2000 m de altitudes....

Presente en el centro y sur de Europa, en la Península aparece en las montañas del norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-paniculata.html>

Ruta chalepensis L.

Planta perenne, glabra, de olor fuerte y desagradable, sabor picante, con tallos de 20 - 60 cm, cilíndricos, de color verde azulado, con numerosas glá...

Crece en matorrales y encinares sobre calizas secas y soleadas, desde el nivel del mar a los 600 m de altitud. Con mucha frecuencia se cultiva como or...

Presente en el sur de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ruta-chalepensis.html>

Leotia lubrica (Scop.) Pers.

Macroscopía. Fructificaciones de 30 a 60 mm de longitud, divididas en un pedúnculo y una cabeza. Esta última es irregularmente redondeada y aplanada, ...



Crece formando grupos en bosques húmedos de planifolios....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leotia-lubrica.html>

Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas). Sombrero: de 8 - 12 cm de diámetro, carnoso, viscoso en tiempo húmedo, blanquecino, pro...

Crece bajo árboles planifolios en verano y otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hebeloma-radicosum.html>

Novedades corológicas

Psathyrella opaca (Romagn.) M.M. Moser ex Kits van Wav. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 16/11/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/psathyrella-opaca-romagn-m-m-moser-ex-kits-van-wav-1/5931.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agaricus gennadii (Chatin & Boud.) P. D. Orton (Basidiomycota)

Alpova rubescens (Vittad.) Trappe (Basidiomycota)

Amanita torrendii Justo (Basidiomycota)

Anas acuta Linnaeus, 1758 (Chordata)

Anas falcata (Chordata)

Anas formosa (Chordata)

Anas sibilatrix (Chordata)

Anas strepera Linnaeus, 1758 (Chordata)



Calycina herbarum (Pers.) Gray (Ascomycota)

Coprinus leiocephalus P. D. Orton (Basidiomycota)

Melanoleuca cinereifolia (Bon) Bon (Basidiomycota)

Psathyrella opaca (Romagn.) M.M. Moser ex Kits van Wav. (Basidiomycota)

Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper & Noordel. (Basidiomycota)

Ruta chalepensis L. (Magnoliophyta)

Ruta chalepensis subsp. *bracteosa* DC. (Magnoliophyta)

Tadorna ferruginea (Chordata)

Tadorna tadorna (Chordata)

Tatraea dumbirensis (Velen.) Svrcek (Ascomycota)

