



Num. 208. Publicado el 15/12/2008

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Taxus baccata*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 208. Publicado el 15/12/2008

Descripciones de especies

Phyllactinia mali (Duby) U. Braun

Hongo que desarrolla ascomas (cleistotecios) esféricos, superficiales, diminutos, de 170 - 250 μ m de diámetro de color amarillento, anaranjado o...

Parásita de Crataegus, Pyrus, Malus y Mespilus....

Ampliamente distribuida en Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phyllactinia-mali.html>

Lactarius hepaticus Plowr. in Boud.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos, setas o basidiomas. Sombrero: de color pardo rojizo, variable según la edad de los ejemplares y las condicio...

Es una de las especies más frecuentes en los pinares arenosos al final de la temporada....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-hepaticus.html>

Gelidium maggisae Rico & Guiry

Talo rojo a pardo-rojizo, formado por ramas cilíndricas postradas que sirven de rizoides y ramas erguidas más o menos aplanadas. Tanto las ramas ergui...

Habita en fondos submareales de maërl, junto con Gelidiella calcicola....

Especie restringida a las costas atlánticas europeas (Irlanda y Galicia), siendo las poblaciones gallegas las únicas que se conocen en toda la Penínsu...

Por RICO ORDÁS, J.M.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gelidium-maggisae.html>

Choreonema thuretii (Bornet) F. Schmitz

Alga semiendofítica de la que son visibles únicamente sus conceptáculos sésiles sobresaliendo del huésped. Éstos conceptáculos, calcificados, son de g...

Semiendofítica en Jania y Haliptilon....



Ampliamente distribuida por aguas marinas templadas y tropicales....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/choreonema-thuretii.html>

Blechnum spicant (L.) Roth

Helecho provisto de un grueso y corto rizoma, con páleas linear - lanceoladas en el ápice de color pardo oscuro. Las frondes, de 8 - 70 x 3 - 7 cm, so...

Crece en zonas sombrías y húmedas sobre suelos ácidos. Es una planta característica de comunidades pertenecientes al orden Quercetalia roboris (clase ...

Aparece en toda Europa, el norte de África y Macaronesia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/blechnum-spicant.html>

Novedades corológicas

Phyllactinia mali (Duby) U. Braun (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 11/12/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/phyllactinia-mali-duby-u-braun-1/6112.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anser albifrons (Chordata)

Anser cignoides (Chordata)

Branta leucopsis (Chordata)

Branta ruficollis (Chordata)

Branta sandvicensis (Chordata)

Chlorociboria aeruginella (P. Karst.) Dennis ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra (Ascomycota)

Choreonema thuretii (Rhodophyta)



Cistus ladanifer L. (Magnoliophyta)

Gelidium maggisae (Rhodophyta)

Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer (Basidiomycota)

Hygrocybe laeta (Pers.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Inocybe hirtella var. *bispora* (Basidiomycota)

Inocybe hystrix (Fr.) P. Karst. (Basidiomycota)

Lepiota brunneoilacea Bon & Boiffard (Basidiomycota)

Phyllactinia mali (Duby) U. Braun (Ascomycota)

