



## Num. 21. Publicado el 02/05/2005

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Dinoptera collaris*. Por César Fernández González



## Num. 21. Publicado el 02/05/2005

### Descripciones de especies

#### *Zeus faber* Linnaeus, 1758

Pez bastante fácil de identificar, de unos 60 cm de longitud, de cuerpo redondeado y muy aplanado lateralmente, con escamas solamente en la línea lateral...

Vive entre rocas y algas, desde aguas someras hasta unos 400 metros de profundidad, generalmente en fondos fangosos en los que a veces se entierra. Se...

Cosmopolita...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/zeus-faber.html>

#### *Torpedo torpedo* (Linnaeus, 1758)

Cuerpo aplanado dorsoventralmente, discoidal, de unos 60 cm de longitud. Piel lisa, con dos órganos eléctricos en el dorso. Cabeza achatada, con ojos ...

Individuos solitarios, que viven en fondos de arena o fango hasta 20 m, pero puede llegar a los 100. Se alimenta de pequeños invertebrados. Es una esp...

Desde el Cantábrico a Angola y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/torpedo-torpedo.html>

#### *Thunnus thynnus* (Linnaeus, 1758)

Cuerpo fusiforme y redondeado, muy hidrodinámico. A cada lado del pedúnculo caudal se encuentra una quilla bien desarrollada. La boca es pequeña, con ...

Pelágico, llega a alcanzar unos 100 m de profundidad. Al igual que el bonito del norte, es un nadador muy activo y veloz, capaz de realizar grandes mi...

Mediterráneo y Atlántico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thunnus-thynnus.html>

#### *Scyliorhinus canicula* (Linnaeus, 1758)



Cuerpo alargado, de hasta 70 - 75 cm de longitud. Cabeza plana, con hocico corto y redondeado, que muestra las narinas u orificios nasales conectados ...

En aguas poco profundas, de fondo arenoso o grava, hasta 100 m. Activa durante la noche, cuando se alimenta de moluscos, crustáceos o peces. Ovípara, ...

Desde Noruega a Senegal y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scyliorhinus-canicula.html>

## *Raja clavata* (Linnaeus, 1758)

Cuerpo alargado, que llega a los 80 cm de longitud, de forma redondeada, con hocico y rostro corto. Las pectorales forman los lados del cuerpo, por lo...

En fondos de arena, hasta unos 300 m de profundidad. Se alimenta de noche de crustáceos, moluscos o peces. Especie ovípara, las hembras son capaces de...

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/raja-clavata.html>

## *Raja batis* Linnaeus, 1758

Cuerpo alargado, que llega a los 2 m de longitud, de forma romboidal. Tiene 5 hendiduras branquiales iguales en la zona ventral. Las pectorales forman...

Vive en fondos de arena o fango, entre 10 y 600 m de profundidad. Se alimenta de invertebrados y peces. Es una especie ovípara, que pone cápsulas rect...

Atlántico, Canal de la Mancha y Mar del Norte. Poco frecuente en el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/raja-batis.html>

## *Paracentrotus lividus* (Lamarck, 1816)

Equinoideo de tamaño pequeño - medio, de caparazón de 6 o 7 cm de diámetro, radial, pero comprimido. Tiene 4 - 6 pares de poros en cada placa ambulacr...

Desde la zona mediolitoral hasta los 30 m, entre rocas, charcas de marea o en agujeros excavados. Excava en la roca, creando agujeros característicos,...

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo y NO de África....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/paracentrotus-lividus.html>

## *Holothuria forskali* Chiaje, 1841

Holoturia de 20 - 30 cm, con cuerpo en forma de pepino, con piel gruesa, blanda, viscosa. La parte ventral plana, pardo amarillenta, posee 3 filas de ...

Desde la zona mediolitoral a 70 m, en sustrato rocoso o arenoso. Durante el periodo de reproducción adquieren posturas erguidas, con el gonoporo lo má...

Desde el SO de las Islas Británicas al Mediterráneo y las Azores....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/holothuria-forskali.html>

## *Dasyatis pastinaca* Linnaeus, 1758

Cuerpo con forma discoidal, de unos 45 cm de anchura ya que las pectorales surgen como expansiones a los lados del cuerpo y las ventrales a continuaci...

En fondos de arena o fango, en los que descansa y se entierra echándose arena por encima. Se alimenta de peces, crustáceos, moluscos... Es una especie...

Atlántico, desde el Canal de la Mancha y Mar del Norte meridional al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dasyatis-pastinaca.html>

## *Dasyatis centroura* (Mitchill, 1815)

Cuerpo con forma romboidal, que puede alcanzar y 2 de ancho. Las pectorales surgen como expansiones a los lados del cuerpo y las ventrales a continuac...

En fondos de arena o fango, enterrada a veces, 2 entre 15 - 200 m de profundidad. También puede presentarse en estuarios o ríos. Se alimenta de pequeñ...

Atlántico, desde el Canal de la Mancha y Mar del Norte meridional al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dasyatis-centroura.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com



*Asplenium marinum* L. (Pteridophyta)

*Larus cachinnans* Pallas, 1811 (Chordata)

