



Num. 211. Publicado el 26/01/2009

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Rosellinia thelena*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 211. Publicado el 26/01/2009

Descripciones de especies

Turdus merula Linnaeus, 1758

El mirlo común es un ave bastante común. El macho, de color totalmente oscuro, con el pico amarillo y un anillo ocular del mismo color en primavera y ...

El mirlo vive en zonas arboladas, setos, parques, sotobosques, jardines, matorrales, donde se alimenta de gusanos, insectos, lombrices, frutos, depend...

Aparece en el Paleártico, India y la Región Oriental; está introducido en Australia y Nueva Zelanda. En la Península está ampliamente distribuido, en ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/turdus-merula.html>

Triturus marmoratus (Latreille, 1800)

El tritón jaspeado es un anfibio común, con los machos de 12 - 13 cm y las hembras de 13 - 14.5 cm, de cuerpo robusto, de sección circular algo depri...

Vive en todo tipo de ambientes acuáticos, generalmente de poca corriente, permanentes o temporales, incluso balsas, charcas, lagunas, abrevaderos, poz...

Presente en el norte, centro y oeste de la Península, centro y oeste de Francia y la costa bretona. En la Península únicamente es posible observarlo e...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/triturus-marmoratus.html>

Tragopogon porrifolius L.

Planta de glabra a algo flocosa - lanosa, bianual, con un rizoma cilíndrico del que surgen tallos de 20 - 125 cm. Las hojas, estrechamente lineares, t...

Crece en herbazales alterados, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud. Es característico de comunidades ruderales subnitrófilas de fenología v...

Nativo del centro y este del Mediterráneo y naturalizado en la mayor parte de Europa...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tragopogon-porrifolius.html>



Eucalyptus camaldulensis Dehnh

Árbol que alcanza los 50 m de altura, siempreverde, con la copa amplia, el tronco grueso, con corteza caediza, lisa, blanca con tonos pardos o rojizos...

Crece en suelos secos o húmedos desde el nivel del mar a los 600 m de altitud...

Originario de Australia, en la Península Ibérica es la primera especie de eucalipto cultivada...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eucalyptus-camaldulensis.html>

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

El martín pescador es un ave de tamaño pequeño, de 17 - 19.5 cm, incluyendo el pico (de unos 4 cm), de cuerpo rechoncho, patas y cola cortas y cabeza ...

El martín pescador es un ave sedentaria, no muy abundante, que vive en arroyos, ríos, embalses, lagunas y zonas costeras. Nidifica en agujeros (túnele...

Nidifica en el norte de África, casi toda Europa, excepto el norte de Fenoscandia y Rusia, y zonas de Asia central y meridional. Inverna en el sur y c...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/alcedo-atthis.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Cereopsis novaehollandiae (Chordata)

Coprotus disculus Kimbr., Luck-Allen & Cain (Ascomycota)

Cyphellopsis confusa (Bres.) Reid (Basidiomycota)

Eucalyptus camaldulensis Dehnh (Magnoliophyta)

Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr. (Basidiomycota)

Hypocrea minutispora B.S. Lu, Fallah & Samuels (Ascomycota)



Tadorna variegata (Chordata)

