



Num. 214. Publicado el 15/02/2009

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Tremella globispora*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 214. Publicado el 15/02/2009

Descripciones de especies

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758

El faisán es un ave de 76 - 78 cm de longitud, con 21 - 25.5 cm de longitud del ala, 68 - 89 cm de envergadura y unos 1200 gr de peso; la cola alcanza...

El faisán asilvestrado se encuentra en zonas de moisacos de pastizales, cultivos y bosquetes; se alimenta de todo tipo de materia vegetal y de pequeño...

El faisán es originario del sureste de Asia y se introdujo en Europa probablemente en el siglo XII. En España su distribución está condicionada por la...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phasianus-colchicus.html>

Orchis italica Poir.

Llamativa orquídea perenne con 2 tubérculos en la base, de hasta 37 x 30 mm, sésiles o casi, de los que surgen tallos de 18 - 43 cm, lisos, verdes, gl...

Esta llamativa orquídea vive en prados y claros de matorrales o bosques, tanto en suelos calizos o silíceos, desde los 300 a los 1000 m de altitud. Es...

Aparece en el sur de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. En la Península es posible observarlo en el sur y oeste, con algunas zonas más sep...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/orchis-italica.html>

Miliaria calandra Linnaeus, 1758

El triguero es un ave de unos 16 - 19 cm de longitud, de cuerpo voluminoso y pico grueso, mayor que otros escribanos y con un plumaje no muy diferente...

El triguero vive en medios abiertos dedicados a cultivos agrícolas de secano o regadío, en dehesas abiertas, pastizales, en general en zonas con poco ...

Aparece en la mayor parte de las zonas templadas del Paleártico occidental. Al sur del Mediterráneo aparece como nidificante sólo en el Magreb y es es...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/miliaria-calandra.html>



Lanius collurio Linnaeus, 1758

Ave de unos 28 cm de envergadura y 36 g de peso, con un ala de hasta 9.6 cm de longitud. El macho adulto tiene el pecho y el vientre rosado con tonos ...

El alcaudón dorsirrojo cría en terrenos abiertos, en mosaicos de prados, cultivos y matorrales, mostrando una preferencia por lugares de media montaña...

Es una especie paleártica que aparece por Europa y Asia occidental en climas boreales, templados, mediterráneos y esteparios. En la Península es nidif...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lanius-collurio.html>

Daedalea quercina (L.) Pers.

Basidiocarpos perennes, simples o algunos fusionados lateralmente, de sésiles completamente a didimiados, semicirculares, de hasta 20 cm de ancho y 8 c...

Saprófito sobre fagáceas, como robles y castaños....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/daedalea-quercina.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cantharellus tubaeformis (Bull.) Fr. (Basidiomycota)

Genabea cerebriformis (Harkn.) Trappe (Ascomycota)

Geopora arenicola (Lév.) Kers (Ascomycota)

Geopora cervina (Velen.) T. Schumach. (Ascomycota)

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 (Chordata)

Pleospora herbarum (Pers.) Rabenh. (Ascomycota)

Seseli tortuosum L. (Magnoliophyta)

Sowerbyella radiculata (Sowerby) Nannf. (Ascomycota)

ISSN 1887-5068

