



Num. 226. Publicado el 11/05/2009

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Trichaptum abietinum*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 226. Publicado el 11/05/2009

Descripciones de especies

Tetrastemma longissimum Bürger, 1895

Gusano filiforme de pequeño tamaño (en torno a 2 cm). Cuerpo estrecho, ensanchado al final, de 1-2 mm de diámetro. Cabeza redondeada y aplanada con 4 ...

Aparece entre algas y sedimentos de la zona intermareal, aunque también puede aparecer en el sublitoral, hasta profundidades de 20 m. En Muros de Naló...

Ha sido citado en Nápoles, el Mar Adriático y alrededor de las Islas Británicas. También ha sido citado en algunas zonas de Mar Cantábrico (Santander)...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando & ANADÓN, Nuria

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tetrastemma-longissimum.html>

Sagina saginoides (L.) H. Karst.

Planta herbácea perenne, de 5 a 12 cm, más o menos cespitosa, provistas de numerosos tallos procumbentes o suberectos que pueden estar ramificados. Las...

Crece en pastos húmedos y turberas en zonas altas, de los pisos alpino y subalpino, siendo más rara en el montano; desde los 950 a los 3000 m de altit...

Aparece en zonas montañosas de Europa, el SO de Asia, el NO de África, América del Norte y Groenlandia. En la Península en Sierra Nevada, Cordillera C...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sagina-saginoides.html>

Puccinia obscura Schröt.

Descripción: Hongo de tipo roya, con un ciclo vital complejo, formado por 5 fases que se desarrollan todas en el mismo huésped. Estas fases son las si...

Los picnidios y ecios se desarrollan sobre *Bellis annua* y *Bellis perennis*, y los uredosoros y teliosoros sobre especies de *Luzula*, principalmente Luzu...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-obscura.html>

Primula veris subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitm.



Plantas herbáceas perennes y escaposas, con hojas de 4 - 25 x 1.7 - 7 cm, con el peciolo más largo que el limbo, apenas alado; el limbo es relativamente...

Vive en bosques caducifolios o mixtos, en praderas o matorrales abiertos, en suelos pedregosos, desde el nivel del mar a los 2000 m de altitud. Aparece...

Aparece en Asia Menor y el sur de Europa. En la Península aparece en la mayor parte, de forma dispersa, siendo más abundante en el norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/primula-veris-subsp-columnae.html>

Mitrophora semilibera (DC.) Lév.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o ascomas con un sombrero de 2 - 4 cm, cónico campanulado, alveolado, con costillas verticales y regulares, p...

Vive en sotos y bosquetes, en ocasiones muy abundante bajo *Crataegus monogyna*....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mitrophora-semilibera.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Cudoniella tenuispora (Cooke & Massee) Dennis (Ascomycota)

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Mitrophora semilibera (DC.) Lév. (Ascomycota)

Primula veris subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitm. (Magnoliophyta)

Puccinia obscura J. Schröt. (Basidiomycota)

Sagina saginoides (L.) H. Karst. (Magnoliophyta)

Tetrastemma longissimum (Nemertina)

Trichopezizella nidulus (J. C. Schmidt & Kunze) Raitv. (Ascomycota)

