



Num. 227. Publicado el 18/05/2009

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lactarius musteus*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 227. Publicado el 18/05/2009

Descripciones de especies

Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)

Se trata de una mariposa de tamaño mediano (35-45 mm de envergadura), fácil de identificar por sus colores, con las alas anteriores negras en las que ...

Vive en terrenos secos, prados, bordes de caminos, llanuras, terrenos baldíos,... en una única generación al año. Los imagos vuelan de noche, pero puede...

Aparece en Europa, Asia occidental y central y ha sido introducida en Nueva Zelanda, Australia y Norteamérica para controlar la planta venenosa que le...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tyria-jacobaeae.html>

Platalea leucorodia Linnaeus, 1758

La espátula es un ave de 80 - 93 cm de longitud y 120 - 135 cm de envergadura, inconfundible de cerca por su gran tamaño, coloración general blanca y ...

La espátula vive preferentemente en humedales de poca profundidad, costeros generalmente, como marismas, deltas, rías y estuarios con fondo de arena f...

La espátula aparece en la Región Paleártica, si bien su distribución es fragmentada; en Europa nidifica únicamente en los Países Bajos, España y Franc...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/platalea-leucorodia.html>

Pica pica Linnaeus, 1758

La urraca es una de las aves más conocidas de la fauna ibérica, tanto por su inconfundible aspecto como por sus pocos recatados hábitos. De 42 - 46 cm...

La urraca es un ave muy adaptable, lo que ha permitido que se instale en gran cantidad de hábitats, salvo bosques cerrados y alta montaña; alcanza sus...

La urraca aparece en todo el Hemisferio Norte, faltando sólo en las zonas extremas. En España aparece en todo el territorio, faltando en las islas y C...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pica-pica.html>



Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758

La aceitera es un escarabajo de color negro violáceo que alcanza los 2.5 cm de longitud las hembras, mientras que los machos apenas llegan al centímet...

El ciclo vital de este escarabajo es realmente curioso. La hembra deposita los huevos en el suelo, y al nacer, las larvas suben a una planta con flore...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/meloe-proscarabaeus.html>

Bufo spinosus Daudin, 1803

El sapo común es un anfibio de gran tamaño, con longitudes de los machos entre 60 y 85 mm y de la hembra entre 70 y 120 mm, que pueden superarlas en o...

Es una especie versátil, que se puede encontrar en bosques, zonas de labor, alta montaña, siempre que presenten cursos de aguas lentos o calmos con má...

Aparece desde el norte de África a Caen, en el norte de Francia. De aquí hacia el norte esta especie es sustituida por *Bufo bufo*....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bufo-spinosus.html>

Novedades corológicas

Ophiognomonia melanostyla (DC.) Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Guía, Somiedo. ASTURIAS el día 12/05/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ophiognomonia-melanostyla-dc-sacc-1/7051.html>

Pseudohalonectria lutea Shearer (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Bimeda, Cangas del Narcea. ASTURIAS el día 15/05/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pseudohalonectria-lutea-shearer-1/7078.html>

Psilachnum lanceolatoparaphysatum (Rehm) Höhn. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Guía, Somiedo. ASTURIAS el día 12/05/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//7048.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com



Annulsmagnus triseptatus (S.W. Wong, K.D. Hyde & E.B.G. Jones) J. Campb. & Shearer (Ascomycota)

Ophiognomonium melanostyla (DC.) Sacc. (Ascomycota)

Populus nigra L. (Magnoliophyta)

Pseudohalonectria lutea Shearer (Ascomycota)

Psilachnum lanceolatoparaphysatum (Rehm) Höhn. (Ascomycota)

Ribes petraeum Wulfen (Magnoliophyta)

Sterna albifrons Pallas, 1764 (Chordata)

Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008