



## Num. 238. Publicado el 12/10/2009

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Thymelaea coridifolia* subsp. *dendrobryum*. Por César Fernández González



**Num. 238. Publicado el 12/10/2009**

## Descripciones de especies

*Phaeohelotium trabinellum* (P. Karst.) Dennis

Ascomas gregarios y superficiales de hasta 0,7 mm de diámetro, aislados o confluyentes en pequeños grupos de 2-3 ejemplares, inicialmente cupuliformes...

Crece sobre madera....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phaeohelotium-trabinellum.html>

*Malva neglecta* Wallr.

Planta anual, bienal o perenne, con tallos de hasta 60 cm, si perennes leñosos en la base, el central ascendente, más raro erecto, y los laterales dec...

Crece en zonas incultas, herbazales nitrófilos, campos de cultivo, desde los 600 a los 2050 m de altitud....

Aparece en Europa, el NO de África, el SO de Asia y Canarias. En la Península crece en todo el territorio salvo en el extremo SO....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/malva-neglecta.html>

*Leucoagaricus tener* (P. D. Orton) Bon

Basidiomas con píleos de hasta 35 mm de diámetro, blanquecinos y convexos o acampanados, luego aplanados pero conservando un amplio mamelón obtuso cen...

Hongo saprotrofico que habita en bosques de coníferas y planifolios....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leucoagaricus-tener.html>

*Heliotropium europaeum* L.

Planta anual con tallos de 4 - 40 cm, erectos o ascendentes, normalmente ramificados, con pelosidad de adpresa a erecto - patente, pubescente. Las hoj...

Crece en campos de cultivo y terrenos ruderalizados desde los 250 a los 1000 m de altitud. ...

Aparece en el sur, centro y oeste de Europa, hasta el norte de Francia, la República Checa y el centro de Ucrania....

Por asturnatura.com



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/heliotropium-europaeum.html>

## *Cuthona ocellata* (Schmekel, 1966)

Nudibranchio bastante infrecuente, de hasta 13 mm de longitud, con el cuerpo muy estilizado, de color amarillo oscuro con una línea media blanca que l...

Vive sobre fondos rocosos. Los ejemplares de Schmekel estaban asociados con diversos hidrarios (géneros Haleciurn, Dynamena, Sertularella, Dicoryne, P...

Mediterráneo y zonas atlánticas próximas, siendo rara su presencia....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cuthona-ocellata.html>

## **Novedades corológicas**

### *Flammulaster muricatus* (Fr.) Watling (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arborio, Pravia. ASTURIAS el día 08/10/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/flammulaster-muricatus-fr-watling-1/8024.html>

### *Leucoagaricus tener* (P. D. Orton) Bon (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Puente de Quinzanas, Pravia. ASTURIAS el día 05/10/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/leucoagaricus-tener-p-d-orton-bon-1/7996.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Agrocybe arvalis* (Fr.) Heim & Romagn. (Basidiomycota)

### *Balssia gastii* (Balss, 1921) (Arthropoda)

### *Calliteara pudibunda* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

### *Carabus lineatus* (Arthropoda)

### *Cystolepiota bucknallii* (Berk. & Broome) Singer & Cléménçon (Basidiomycota)

### *Entoloma bloxamii* (Berk. & Broome) Sacc. (Basidiomycota)



*Flammulaster muricatus* (Fr.) Watling (Basidiomycota)

*Hypholoma ericaeum* (Pers.) Kühner (Basidiomycota)

