



## Num. 244. Publicado el 23/11/2009

La revista online *asturnatura.com* es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Hygrophorus russula*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 244. Publicado el 23/11/2009**

## Descripciones de especies

*Zygaena loti* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Es una especie muy polimorfa, con una envergadura de 26-32 mm. Los imagos tienen el color dominante de las alas en negro azulado con seis máculas roja...

Vive en prados y zonas abiertas de junio a julio, en una generación, desde el nivel del mar a 2000 metros. Los imagos tienen un vuelo corto. Como plan...

Esta especie procedente del centro siberiano es la que más se ha expandido en la Península. En efecto, ocupa todo el Norte (excepto su extremo occiden...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/zygaena-loti.html>

*Saxifraga praetermissa* D. A. Webb

Planta perenne cespitosa, estolonífera, postrada, con pelos glandulíferos de hasta 2 mm. Los tallos floríferos que alcanzan hasta los 15 cm, axilares ...

Crece en roquedos y suelos pedregosos de depresiones donde la nieve permanece largo tiempo, principalmente en sustratos básicos, entre los 2200 y los ...

Planta endémica de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-praetermissa.html>

*Favolaschia calocera* R. Heim

Hongo que forma basidiomas estipitados con el himenio alveolado o poroide de color amarillo vivo, que recuerda a un panal de abejas. Los sombrerillos,...

Hongo saprófito de muy diversos restos vegetales (Ulex, Quercus, ...etc)...

Favolaschia calocera fue descrita originalmente en Madagascar, de ahí saltó al continente africano para más tarde ser localizado en Oceanía. Hace unos...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis y RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/favolaschia-calocera.html>



## *Catocala electa* (Vieweg, 1790)

Mariposa del grupo de los noctuidos de tamaño considerable, con las alas anteriores de 65 a 75 mm de envergadura; estas alas, con escamas finas y peq...

Vive en bosques de ribera y parques donde aparezca una vegetación densa. Vuela mediados de junio a principios de octubre, en una generación; durante e...

Aparece en la zona templada y cálida de Europa, donde abunda, pero se extiende todavía hasta Corea. Altitudinalmente alcanza los 1400 m. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/catocala-electa.html>

## *Arenaria purpurascens* Ramond ex DC.

Planta herbácea perenne y cespitosa, de hasta 14 cm, con una cepa muy ramosa de la que surgen tallos erectos o ascendente - erectos, con pelos eglandu...

Crece en los pastos alpinos y subalpinos, en ocasiones en suelos pedregosos o crioturbados, en roquedos algo húmedos y también en pinares, en todo tip...

Aparece en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos Centrales y occidentales y además con una localidad en los Alpes....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arenaria-purpurascens.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Catocala electa* (Arthropoda)

*Dermoloma cuneifolium* (Fr.) Singer ex Bon (Basidiomycota)

*Entoloma catalaunicum* (Singer) Noordel. (Basidiomycota)

*Hemithea aestivaria* (Arthropoda)

*Melolontha melolontha* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Titanio pollinalis* (Arthropoda)

