



Num. 247. Publicado el 14/12/2009

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Entyloma ficariae*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 247. Publicado el 14/12/2009

Descripciones de especies

Tricholoma portentosum (Fr.) Quél.

Hongo que desarrolla basidiomas con un sombrero de 4 - 10 cm de diámetro, de hemisférico a campanulado y finalmente aplanado, algo mamelonado; su cutí...

Aparece en los bosques de coníferas desarrollados sobre suelos ácidos, especialmente de *Pinus sylvestris* desde finales de otoño al invierno....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tricholoma-portentosum.html>

Microglossum nudipes Boud.

Ascomas en forma de clavulas de hasta 50 mm de altura total, claramente diferenciados en una porción cefálica fértil no viscosa de 6-20 x 3-9 mm; fusi...

Suelos herbosos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/microglossum-nudipes.html>

Lathyrus latifolius L.

Planta herbácea perenne, con un rizoma leñoso vertical del que surgen tallos fértiles y estériles, robusta, trepadora y glabra. Los tallos, de hasta 2...

Crece en herbazales húmedos, en sotos y orlas forestales, en suelos de cualquier naturaleza, desde los 40 a los 1500 m de altitud....

Aparece en el centro, sur y este de Europa, el NO de África y Canarias; ha sido introducida en América. En la Península Ibérica es una planta muy frec...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-latifolius.html>

Gyrodon lividus (Bull.) P. Karst.

Hongo que desarrolla basidiomas con un sombrero de 4 - 11 cm de diámetro, abombado, después extendido de forma irregular, con el margen delgado y enro...

Es una especie que micorriza exclusivamente con alisos (*Alnus glutinosa*)....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gyrodon-lividus.html>



Gomphidius roseus (Fr.) Fr.

Hongo que desarrolla basidiomas con un sombrero de 2 a 5 cm de diámetro, de hemisférico a plano, que en ocasiones puede estar deprimido, y con el marg...

Crece durante en otoño en zonas donde haya pino (*Pinus sylvestris*). Es muy frecuente verlo acompañado de *Suillus bovinus*...

Es una especie muy rara....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gomphidius-roseus.html>

Novedades corológicas

Cortinarius aprinus Melot (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Trascañedo, Regueras (Las). ASTURIAS el día 07/12/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cortinarius-aprinus-melot-1/8275.html>

Tuber rapaeodorum Tul. & C. Tul. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Navia, Navia. ASTURIAS el día 07/12/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/tuber-rapeodorum-tul-c-tul-1/8282.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aglaope infausta (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Anas penelope Linnaeus, 1758 (Chordata)

Clavaria zollingeri Lév. (Basidiomycota)

Cortinarius dionysae Rob. Henry (Basidiomycota)

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (Basidiomycota)

Hygrocybe flavipes (Britzelm.) Arnolds (Basidiomycota)

Hygrophorus russula (Schaeff.) Quél. (Basidiomycota)

Leccinum lepidum (H. Bouchet in Essete) Quadr. (Basidiomycota)



Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) (Arthropoda)

Lyophyllum infumatum (Bres.) Kühner (Basidiomycota)

Microglossum nudipes Boud. (Ascomycota)

Parasemia plantaginis (Arthropoda)

Satyrium w-album (Knoch, 1782) (Arthropoda)

Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008