



## Num. 25. Publicado el 30/05/2005

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Discus rotundatus*. Por César Fernández González



**Num. 25. Publicado el 30/05/2005**

## Descripciones de especies

### *Polycera faeroensis* Lemche, 1929

Nudibranchio de hasta 45 mm de longitud, de color blanco translúcido, muy parecido a *Polycera quadrilineata*. Tiene 8 o más papilas alrededor del borde ...

En aguas poco profundas, charcas, sobre rocas. Se alimenta de briozoos como *Crisia denticulata*, *Bugula*, *Bicellariella*, *Cellepora pumicosa*, *Membranipo*...

Desde las Islas Feroes hasta el Cantábrico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polycera-faeroensis.html>

### *Phallusia mamillata* (Cuvier, 1815)

Ascidia solitaria, de hasta 14 cm de longitud. Cuerpo oval, más ancho en la base. La túnica es lisa y gruesa, y está cubierta con papilas redondeadas....

Sobre piedras hasta los 180 m, en zonas con sedimentos....

Desde el oeste de las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phallusia-mamillata.html>

### *Pentapora fascialis* (Pallas, 1766)

Colonias erectas, planas, que alcanzan 15 - 20 cm de altura. Son láminas con zooides por ambas caras, fuertemente calcificadas e irregulares, con lóbulos...

Especie sublitoral, crece en conchas, piedras o rocas....

Desde el O de las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pentapora-fascialis.html>

### *Membranipora membranacea* (Linnaeus, 1767)

Colonias de tamaño variable, incrustante, generalmente con aspecto de alfombra. Zooides rectangulares, con espinas cortas o tubérculos en las esquinas...



Sobre frondes de Laminaria, más raramente Fucus....

Desde el norte de Europa al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/membranipora-membranacea.html>

## *Hymeniacidon sanguinea* (Grant,1826)

Esponja que forma masas incrustantes o almohadilladas, ocasionalmente redondeadas, de hasta 15 cm de longitud y 2 - 5 cm de grosor. Superficie designa...

Sobre piedras. Tolera la desecación, por lo que puede vivir en la zona intermareal en cavidades, grietas o salientes de las rocas. En la zona infralittoral...

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hymeniacidon-sanguinea.html>

## *Clavelina lepadiformis* (Müller, 1776)

Ascidia colonial con individuos libres, de 2 cm de altura, pero conectados entre si por la base por una red de estolones gelatinosos. Aunque se pueden...

En piedras, algas, conchas, hasta los 50 m. Se encuentran también sobre estructuras artificiales portuarias, como los pantalanes....

Desde el Sur de Noruega a las Azores y Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/clavelina-lepadiformis.html>

## *Chondria capillaris* (Hudson) Wynne

Talo de 5 a 25 cm de altura, cilíndrico o irregularmente redondeado, que consiste en ejes erectos que surgen de un disco basal rizoidal de 2 - 4 mm de...

En rocas y sustratos móviles, como conchas, piedras, en charcas y aguas poco profundas hasta los 6 m de profundidad, en lugares ligeramente calmados....

Desde las Islas Británicas a la costa oeste africana; Mediterráneo incluido. India, Pakistán y Tanzania....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chondria-capillaris.html>

## *Botryllus schlosseri* (Pallas, 1774)



Ascidas que forman colonias planas, incrustantes y lobuladas, a veces almohadilladas y flexibles. Están formadas por 3 - 12 individuos de 0.2 cm de a...

En aguas poco profundas, fijado a rocas o algas, incluso a otros animales como ascidas y a estructuras artificiales....

Toda la costa europea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/botryllus-schlosseri.html>

## *Bolinopsis infundibulum* (Müller, 1776)

Ctenóforo de cuerpo más o menos transparente, con forma de pera, alargado, de 15 cm de longitud. Presenta dos lóbulos orales grandes y dos tentáculos ...

Pelágico, a menudo en grupos....

Atlántico Norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bolinopsis-infundibulum.html>

## *Adocia cinerea* (Grant, 1826)

Esponja incrustante, que forma protuberancias o chimeneas gruesas, redondeadas, tubulares o cónicas. Los ósculos, de 1 - 2 mm de diámetro, se encuentr...

Sublitoral, en rocas y piedras estables....

Desde el norte de las Islas Británicas hasta las costas atlánticas españolas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/adocia-cinerea.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Aslia lefevrei* (Echinodermata)

*Crucianella maritima* L. (Magnoliophyta)

*Gavia stellata* (Pontoppidan, 1763) (Chordata)

*Pawsonia saxicola* (Echinodermata)

