



## Num. 253. Publicado el 01/02/2010

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Grifola frondosa*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 253. Publicado el 01/02/2010**

## Descripciones de especies

*Pseudohydnum gelatinosum* (Scop.) P. Karst.

Macroscopía: cuerpos fructíferos o basidiomas aislados o generalmente imbricados y de consistencia gelatinosa, con aspecto de lingüiforme a flabelifor...

Crece sobre madera podrida, especialmente tocones, de coníferas, durante verano y otoño en tiempo húmedo y lluvioso...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pseudohydnum-gelatinosum.html>

*Plebejus argus* (Linnaeus, 1758)

Es una especie muy variable. El macho tiene el anverso de color violeta, generalmente con margen ancho oscuro, con la nerviación marcada y puntos oscu...

Vive en brezales, zonas arbustivas y prados, desde el nivel del mar hasta 1.800 metros. Vuela desde junio a septiembre, en dos generaciones al año. Lo...

Está extendida por toda Europa hasta Asia. Está presente en gran parte de la Península Ibérica, especialmente en la zona norte. En Asturias se encuent...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/plebejus-argus.html>

*Erebia meolans* (Prunner, 1789)

Es una especie polimorfa. El macho tiene el anverso de color marrón oscuro, con una banda roja en el ala anterior que incluye normalmente en el ápice ...

Vive en laderas rocosas con hierbas, praderas y márgenes de caminos, desde zonas bajas (300 m) en desfiladeros o estribaciones de sierras como el Cuer...

Está extendida de forma dispersa por distintos sistemas montañosos de Europa. En la Península Ibérica está presente en zonas montañosas del centro y d...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erebia-meolans.html>

*Calidris alba* (Pallas, 1764)



El correlimos tridáctilo es un ave de 20 - 21 cm de longitud y 40 - 45 cm de envergadura. Su plumaje es bastante pálido en general. El adulto tiene el...

El correlimos tridáctilo vive en zonas de clima muy frío en su época reproductora, en zonas donde abundan céspedes, musgos y líquenes; fuera de ésta a...

Su zona de cría se localiza en torno al Ártico, en las costas más nórdicas de América, Groenlandia y el norte de Asia, invernando en la zona meridiona...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calidris-alba.html>

*Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller, 1775)

El macho de la tornasolada chica tiene el anverso de color de fondo oscuro, con reflejos azul- violáceos (como el macho de *Apatura iris*), producto de ...

Esta llamativa mariposa vive en bosques de ribera, desde medianas altitudes (300 metros en el concejo de Cangas del Narcea) hasta más de 700 metros. V...

Está extendida por el sur y centro de Europa hasta Asia. En la Península Ibérica está presente en la zona norte de forma muy dispersa, siendo más abun...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/apatura-ilia.html>

## **Novedades corológicas**

*Clavicornona taxophila* (Thom) Doty (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Los Torollos, Oviedo. ASTURIAS el día 31/01/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/clavicornona-taxophila-thom-doty-1/8509.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Anemone x hybrida* (Magnoliophyta)

*Cinclus cinclus* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Clavicornona taxophila* (Thom) Doty (Basidiomycota)

*Sistotrema muscicola* (Pers.) S. Lundell in Lundell & Nannf. (Basidiomycota)

