



Num. 254. Publicado el 08/02/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Diaporthe rudis*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 254. Publicado el 08/02/2010

Descripciones de especies

Satyrium w-album (Knoch, 1782)

El macho tiene el anverso de color marrón oscuro; el reverso es del mismo color, con una línea blanca transversal que atraviesa ambas alas, semejando ...

Aparece en zonas boscosas, desde el nivel del mar hasta 1500 metros. Aunque hemos encontrado un ejemplar excepcionalmente a finales de mayo de 2007, ...

Está extendida por parte del sur, el centro y el este de Europa hasta Asia. En la Península Ibérica es una especie rara, distribuida en una franja que...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/satyrium-w-album.html>

Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853)

El macho tiene el anverso de color leonado vivo, con ancho margen oscuro, venas también oscuras y androconia marcada; el reverso es verde-anaranjado, ...

Vive en prados, márgenes de bosques, taludes y terrenos baldíos, desde el nivel del mar hasta los 1600 metros. Vuela de abril a octubre, en dos genera...

Está extendida por la mayor parte de Europa hasta Asia. En la Península Ibérica está distribuida de forma similar a *Hesperia comma*. En Asturias es com...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ochlodes-venata.html>

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Esta mariposa es la más pequeña de los píeridos de Asturias, con una envergadura alar de 32 - 44 mm. El macho tiene el anverso de color blanquecino, c...

Inmediaciones de los bosques de ribera, prados húmedos y bordes de camino en la cercanía de zonas forestadas, desde el nivel del mar hasta 1500 metros...

Está extendida por toda Europa. La reciente separación de *Leptidea sinapis* y *Leptidea reali* Reissinger 1989 como especies diferentes ha llevado consig...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leptidea-sinapis.html>



Cupido minimus (Fuessly, 1775)

Esta mariposa, con una envergadura alar de 18 - 22 mm, es el licénido más pequeño de Europa occidental. El macho tiene el anverso de color marrón oscuro...

Vive en prados húmedos y terrenos abiertos, desde zonas costeras a más de 2.000 metros. Vuela desde abril a julio, en dos generaciones al año. Los ima...

Está extendida por la Península Ibérica y gran parte de Europa, hasta Asia. En la Península es frecuente en las zonas montañosas del norte, y más espo...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cupido-minimus.html>

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)

Hespérido con una envergadura alar de 26 a 30 mm. El macho tiene el anverso de color marrón oscuro con grandes puntos amarillos; el reverso es parecid...

Vive en prados húmedos y claros de bosque, encontrándose habitualmente en las cercanías de zonas arboladas y cursos de agua, desde 200 a 1.400 metros ...

Está extendida por Europa hasta Asia. En la Península Ibérica tiene tres núcleos de distribución: el Pirineo central, Vizcaya y Asturias y una pequeña...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carterocephalus-palaemon.html>

