



Num. 261. Publicado el 29/03/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Cairina moschata*. Por César Fernández González



Num. 261. Publicado el 29/03/2010

Descripciones de especies

Vaucheria coronata Nordstedt

Algas cuyo talo está formado por filamentos sifonales de 40 - 65 μ m de diámetro, monoicos o dioicos. Anteridios solitarios y situados en la term...

Crece en zonas del intermareal o salobres....

En Europa aparecen en el Mar Báltico, Islas Británicas, Islas Feroes, Francia, Noruega, Portugal, España. En Norteamérica en Maine, Massachusetts y C...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vaucheria-coronata.html>

Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)

Mariposa con una envergadura alar de 35 - 40 mm y que presenta un marcado dimorfismo sexual. El macho tiene el anverso del ala anterior de color de fo...

Aparece de junio a agosto en una generación en prados húmedos, llanuras, claros de bosque y turberas, habiendo sido citada hasta los 3000 metros. Tien...

Ampliamente distribuida en Europa y en la P. Ibérica, especialmente en zonas montañosas....

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/parasemia-plantaginis.html>

Diopatra neapolitana (Delle Chiaje, 1841)

Gusano robusto y alargado de tamaño grande con una longitud aproximada de 30-35 cm, que presenta una coloración verde iridiscente y 15-16 anillos en l...

El género *Diopatra* (Audouin y Milne-Edwards, 1833) agrupa un gran número especies de poliquetos onúfidos que habitan en la zona intermareal y submareal...

Hasta hace poco tiempo, en aguas europeas sólo se reconocía una especie de este género, *Diopatra neapolitana* (Delle Chiaje, 1841). *D. neapolitana* ha s...

Por ARIAS RODRÍGUEZ, Andrés & ANADÓN, Nuria

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/diopatra-neapolitana.html>



Boloria pales (Denis & Schiffermüller, 1775)

Se trata de una mariposa polimorfa. El macho tiene el anverso de color anaranjado con doble serie de puntos negros en ambas alas; en el reverso del al...

Vive en brezales, roquedos y prados de alta montaña, desde 1.400 a 2.000 metros. Vuela de junio a agosto, en una generación al año. Los imagos visitan...

Está extendida solamente por niveles alpinos y subalpinos del sur de Europa. En la Península Ibérica solamente vuela en los Pirineos y en la Cordille...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/boloria-pales.html>

Ascobolus viridis Curr.

Macroscopía: ascomas gregarios o dispersos de hasta 6 x 2 mm, turbinados, cupuliformes, con el himenio convexo o ligeramente deprimido, inicialmente d...

Crece en sustratos básicos y húmedos, desde primavera a otoño....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ascobolus-iridis.html>

Novedades corológicas

Hyaloscypha intacta S v r e k (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santullano, Tineo. ASTURIAS el día 24/03/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hyaloscypha-intacta-svr-ek-1/8787.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ascobolus denudatus Fr. (Ascomycota)

Ascobolus viridis Curr. (Ascomycota)

Coprinus pseudocortinatus Locq. ex Cacialli, Caroti & Doveri (Basidiomycota)

Diopatra neapolitana (Delle Chiaje, 1841) (Annelida)

Hyaloscypha intacta S v r e k (Ascomycota)



Melampsora populnea (Pers.) P. Karst. (Basidiomycota)

Paeonia mascula (L.) Mill. (Magnoliophyta)

Parus palustris Linnaeus, 1758 (Chordata)

Vaucheria coronata (Ochromytha)

