



## Num. 262. Publicado el 05/04/2010

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Cenangium ferruginosum*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 262. Publicado el 05/04/2010**

## Descripciones de especies

### *Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758)

Mariposa con una envergadura alar de 35 - 55 mm, cuyas alas anteriores son de color marrón grisáceo, jaspeado de finas líneas negras y grises en zigza...

Aparece en bosques caducifolios, huertos y parques de julio a septiembre, en una generación al año, hasta los 1200 metros. Es de actividad diurna, cre...

Ampliamente distribuida por Europa y Asia hasta Japón. Está presente en toda la Península Ibérica....

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lymantria-dispar.html>

### *Lamium hybridum* Vill.

Planta anual con tallos de entre 10 y 30 cm, decumbentes, ascendentes o erectos, que aunque a veces son simples generalmente están ramificados desde l...

Vive en herbazales, pastizales húmedos, en zonas arvenses o ruderales y claros de robledales y pinares, desde los 250 a los 1500 m de altitud....

Aparece en gran parte de Europa, alcanzando el SO de Asia, el NO de África, Madeira y las Islas Canarias. En la Península es frecuente en la parte nor...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lamium-hybridum.html>

### *Erebia manto* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Mariposa con una envergadura alar de entre 34 y 44 mm; es una especie muy polimorfa. El macho tiene el anverso de color marrón muy oscuro, sin ocelos ...

Vive en prados floridos situados en la cercanía de zonas boscosas, entre los 900 y los 1.800 metros. En Asturias ha sido citada en una zona de roquedo...

Está extendida por escasos macizos montañosos del sur y centro de Europa. Se ha descrito la subespecie constans Eiffinger 1906, que vuela en la Peníns...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erebia-manto.html>



## *Argynnis niobe* (Linnaeus, 1758)

Mariposa con una envergadura alar de 46 - 58 mm. El macho tiene el anverso de color leonado vivo y con puntos oscuros como otros ninfálidos, con una e...

Vive en zonas abiertas y prados floridos, entre 800 y 1800 metros de altitud. Vuela de mediados de mayo a agosto, en una generación al año. La puesta ...

Está extendida por gran parte de Europa hasta el centro de Asia. En la Península Ibérica al parecer vuela exclusivamente la forma eris Meigen 1829, qu...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/argynnis-niobe.html>

## *Apatura iris* (Linnaeus, 1758)

Es uno de los ninfálidos de mayor tamaño, con una envergadura alar de 64 - 74 mm. El macho de la tornasolada tiene el anverso de color de fondo marrón...

Vive en bosques de ribera y sus inmediaciones (aunque debido a su vuelo potente se pueden encontrar ejemplares, probablemente de paso, también en biot...

Está extendida por gran parte de Europa hasta Asia. En la Península Ibérica está presente principalmente en la mayor parte de la zona norte. Considera...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/apatura-iris.html>

## **Novedades corológicas**

### *Coprotus lacteus* (Cooke & W. Phillips) Kimbr., Luck-Allen & Cain (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Fastias, Tineo. ASTURIAS el día 04/04/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coprotus-lacteus-cooke-w-phillips-kimbr-luck-allen-cain-1/8854.html>

### *Peziza vacinii* (Velen.) Svr ek (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Callezuela, Illas. ASTURIAS el día 01/04/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/peziza-vacinii-velen-svr-ek-1/8839.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**



*Coprotus lacteus* (Cooke & W. Phillips) Kimbr., Luck-Allen & Cain (Ascomycota)

*Heterochaete shearii* (Burt) Burt (Basidiomycota)

*Lysidice ninetta* (Annelida)

*Muscari neglectum* Ten. (Magnoliophyta)

*Onchidella celtica* (Cuvier, 1816) (Mollusca)

*Peziza fimeti* (Fuckel) Seaver ss. Donadini, Gamundi (Ascomycota)

*Peziza repanda* Pers. (Ascomycota)

*Peziza vacinii* (Velen.) Svr ek (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008